

**Título: Comportamiento del  
Intento Suicida en Niños y  
Adolescentes.**

**Hospital Pediátrico Docente**

**“Juan M. Márquez” 2004-2012**

---

## **Autoras:**

**Dra. Silvia León Reyes**  
**Especialista y Profesora Asistente en Pediatría.**  
**Master en Atención Integral al Niño**  
**Responsable Sección Adolescencia**  
**Hosp.Ped.Doc. " J.M. Márquez "**

**Dra. Damaris Lainé Gómez**  
**Especialista en Pediatría.**  
**Profesora Asistente**  
**Master en Atención Integral al Niño**

---

# Resumen

**La infancia es considerada una etapa en la que la conducta suicida no debería presentarse, sin embargo ocurre. Es hoy un fenómeno en aumento, no tan evidente como otros problemas de salud. Con el objetivo de precisar el comportamiento de la conducta suicida en niños y adolescentes, se realizó un estudio retrospectivo y comparativo de los intentos suicidas atendidos en el Hospital Juan M. Márquez de La Habana en los trienios 2004-2006, 2007-2009 y 2010-2012. Las fuentes de información fueron el Departamento de Registros Médicos del Hospital, reportes, tarjetas de Declaración Obligatoria y hojas de cargo. Las variables analizadas fueron: grupos de edades, sexos y procedencias.**

**Palabras clave: conducta suicida; Intento suicida; adolescentes.**

**Tabla 1. Comportamiento del intento suicida. Pediátrico Docente Juan M. Márquez. Distribución por Trienios y Grupos de edades.**

<b>Trienios</b>	<b>GRUPOS DE EDADES</b>				
	<b>-10 a</b>	<b>10 -14 a</b>	<b>15 -18a</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
<b>2004- 06</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>84</b>	<b>184</b>	<b>13.4</b>
<b>2007- 09</b>	<b>4</b>	<b>210</b>	<b>294</b>	<b>508</b>	<b>37.1</b>
<b>2010 - 12</b>	<b>13</b>	<b>255</b>	<b>409</b>	<b>677</b>	<b>49.5</b>
<b>Totales</b>	<b>17</b>	<b>565</b>	<b>787</b>	<b>1369</b>	<b>100.0</b>

**Fuente Dpto. Registros Médicos Hospital J. M.M**

**Tabla 2. Comportamiento del intento suicida. Pediátrico**  
**Docente Juan M. Márquez. Distribución por sexos.**

<b>Trienios</b>	<b>SEXOS</b>				
	<b>Femenino</b>	<b>%</b>	<b>Masculino</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>
<b>2004-06</b>	<b>160</b>	<b>86.9</b>	<b>24</b>	<b>13.1</b>	<b>184</b>
<b>2007-09</b>	<b>437</b>	<b>86.0</b>	<b>71</b>	<b>14.0</b>	<b>508</b>
<b>2010- 12</b>	<b>543</b>	<b>80.2</b>	<b>134</b>	<b>19.8</b>	<b>677</b>
<b>Totales</b>	<b>1140</b>	<b>83.3</b>	<b>229</b>	<b>16.7</b>	<b>1369</b>

**Fuente Dpto. Registros Médicos Hospital J. M.M**

**Tabla 3. Comportamiento del intento suicida. Pediátrico**  
**Docente Juan M. Márquez. Distribución por procedencia**

<b>Trienios</b>	<b>Procedencia</b>				
	<b>Habana</b>	<b>Artemisa</b>	<b>Mayabeque</b>	<b>Otras</b>	<b>Total</b>
<b>2004-06</b>	<b>104</b>	<b>59</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>184</b>
<b>2007-09</b>	<b>335</b>	<b>129</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>508</b>
<b>2010-12</b>	<b>420</b>	<b>182</b>	<b>63</b>	<b>12</b>	<b>677</b>
<b>TOTAL</b>	<b>859</b>	<b>370</b>	<b>126</b>	<b>14</b>	<b>1369</b>


**Fuente Dpto. Registros médicos Hospital J.M.M.**

**Tabla 4. Comportamiento del intento suicida. Pediátrico**  
**Docente Juan M. Márquez. Distribución por procedencia**

<b>Trienios</b>	<b>Procedencia de La Habana</b>				
	<b>Marianao</b>	<b>Playa</b>	<b>Lisa</b>	<b>Otros Mpios.</b>	<b>Total</b>
<b>2004-06</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>104</b>
<b>2007-09</b>	<b>93</b>	<b>79</b>	<b>62</b>	<b>101</b>	<b>335</b>
<b>2010-12</b>	<b>103</b>	<b>112</b>	<b>89</b>	<b>116</b>	<b>420</b>
<b>Total</b>	<b>226</b>	<b>219</b>	<b>171</b>	<b>243</b>	<b>859</b>

**Fuente Dpto. Registros médicos Hospital J.M.M**


## GRÁFICO 1. Comportamiento del Intento Suicida. Hospital Juan M. Márquez, 2004-2012, por EDADES




■ -10 años ■ 10-14 a ■ 15-18 a ■ total



## GRÁFICO 2. Comportamiento del Intento Suicida. Hospital Juan M. Márquez, 2004-2012, por SEXOS.



### GRÁFICO 3. Comportamiento del Intento Suicida. Hospital Juan M. Márquez, 2004-2012, PROCEDENCIA



---

# Conclusiones

- **Se constató un incremento del intento suicida particularmente en adolescentes, a partir del trienio 2007-2009**
  - **La conducta predominó en adolescentes de 15-18 años de edad y en el sexo femenino.**
  - **El mayor número de pacientes procedía de los Municipios Marianao y Playa en Ciudad de La Habana y de la provincia Artemisa.**
-

---

# Comentarios

- No estamos trabajando pasivamente con cifras, actualmente el Grupo Nacional de Atención a las y los adolescentes. Además de Promover el Programa Nacional de prevención de la Conducta Suicida, ha considerado imperiosa la identificación de los *Factores de Riesgo* que pueden estar favoreciendo esta situación, para lo cual se está implementando un proyecto de investigación abarcador, que incluye a cada paciente pediátrico que acude al Centro con el diagnóstico de IS.
-

---

# **¿ALGUNA PREGUNTA?**

- **GRACIAS por la atención.**
-