

PSICOSIS EN LA ADOLESCENCIA

SPAJ

LUIS MATOS R.
UPCH INSM

-
- ¿Cuándo hablamos de psicosis?

Manifestaciones principales de estados psicóticos.

-
- DELUSIONES

-
- HALUCINACIONES

-
- PENSAMIENTO PRECATEGORIAL

-
- “SOÑAR CON LOS OJOS A BIERTOS”

-
- PERDIDA DE CONTACTO CON LA REALIDAD

-
- SON INDICADORES INESPECÍFICOS DE ENFERMEDAD MENTAL SEVERA

-
- La esquizofrenia es el trastorno mental mas devastador que afecta a niños y adolescentes

-
- Extremadamente rara antes de los 10 años, su incidencia crece a lo largo de la adolescencia y logra su pico máximo en la adultez temprana.

-
- Es muy importante Dx. Y Tto. Tempranos.

-
- Como antecedentes importantes:
- RETRASO EN DESARROLLO DE LENGUAJE, LECTURA Y CONTROL VESICAL

-
- **20% DE CASOS DE ESQUIZOFRENIA
ADOLESCENTE PRESENTAN RETRASO EN
DESARROLLO MOTOR O DEL LENGUAJE**

- INICIO INSIDIOSO
- DECLINACION LENTA PERO CONSISTENTE EN FUNCIONAMIENTO SOCIAL Y ACADEMICO

-
- .CURSO CRONICO

..

- UN QUINTO SE RECUPERA

-
- UN TERCIO VA AL DETERIORO SEVERO

- CUANTO MAS TEMPRANO SE INICIA
PEOR PRONOSTICO

..

- EN GENERAL PEOR PRONOSTICO QUE T.
AFECTIVO BIPOLAR

-
- A NIVEL FAMILIAR

ALTOS NIVELES DE EMOCION EXPRESADA

-
- INFLUYEN EN INICIO Y RECAIDAS

.DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

PSICOSIS

T A BIPOLAR

DEPRESION PSICOTICA

T.DEL DESARROLLO: AUTISMO

P. ESQUIZOTÍPICA



-

CONDICIONES ORGANICAS

DROGAS

EPILEPSIA

ENF. DE WILSON

-

MANEJO

- Tratamiento especializado, multiprofesional
- Antipsicóticos
 - Tipicos
 - Atipicos

-

- INTERVENCION FAMILIAR
- Aceptación del problema.
FAMILIAS DE ALTO RIESGO.

-
- ACOMPAÑAMIENTO
- SOLIDARIDAD
- EMPATIA



¡GRACIAS!

¡ GRACIAS!

LMR

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

Construyendo Jueces
Una justicia oportuna
y accesible

