## La Atención Integral a Adolescentes

## "Que necesita un Profesional"

Dra. Francisca Cruz Sánchez
CUBA

# Daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé.

**Descartes** 

Desarrollo humano (biologico, psicologico y social)

**Endocrinologia puberal** 

Atencion integral en la adolescencia

Ginecologia basica

Psicologia evolutiva basica

Sexualidad humana

**Orientacion legal** 

Funcionamiento familiar

Problemas de escolaridad

#### Relacion Medico-Adolescente-Familia

Crecimiento y Desarrollo Nutricion

Riesgos

Deteccion precoz de trastornos o problemas

Cuidado y autocuidado de la Salud

**Prevencion-Educacion-Orientacion** 

- □ Variación individual en la edad de inicio del crecimiento
- Aparición de la pubertad 1,5 a 2 años en las niñas antes que los varones
- El proceso de maduración puede durar de 2 a 5 años.

La tendencia secular muestra que la menarquia tiende a ser más temprana que en las madres, y la talla final es más alta que la de sus padres tanto en uno como en otro sexo.



#### **SEXO FEMENINO**

- Sudor con olor, que es menos intenso que en los varones.
- •El crecimiento de la pelvis puede aparecer entre los 9 y 10 años.
- Desarrollo mamario
- Vello pubiano

#### **SEXO FEMENINO**

- Desarrollo de labios mayores y menores de la vulva
- Los ovarios triplican su tamaño entre los 9 y 14 años,
- •la vagina crece en longitud hasta después de la Menarquia
- •el Útero aumenta de tamaño después de los 7 años .

#### **SEXO MASCULINO**

- •Sudor con olor, mas fuerte que en adolescentes femeninas.
- Aumento del volumen testicular
- Desarrollo del pene y bolsa escrotal (acompañada de enrojecimiento y pliegue de la piel)
- Vello pubiano
- ·Las mamas aumentan de tamaño y puede observarse ginecomastia puberal fisiológica.
- Vello axilar (aumenta 2 años después del vello pubiano)

- •La espermarquia es el inicio de la emisión de esperma y sucede tempranamente en la pubertad, alrededor de los 13,4 años pero puede variar entre los 10.6 y 14.6 años.
- •Las eyaculaciones involuntarias que tienen lugar durante el sueño se denominan poluciones nocturnas.
- •La actividad prostática puede comenzar alrededor de los 11-12 años antes de que aparezca el vello pubiano.

- ■•Vello facial: hay un cambio tardío alrededor de los 14,9 años (rango más o menos de 1.5
- **■• Estirón puberal tardío**
- La velocidad máxima de crecimiento es a los 14 años y el 99% alcanza la talla adulta a los 16.8 años pues la detención del crecimiento ocurre alrededor de los 21 años

•El vello corporal y el acné aparecen entre los 16 y 17 años.

El estadio 2 de genitales, que marca el inicio del desarrollo sexual en los varones, puede aparecer tan tempranamente como a los 8,7 años y tan tarde como a los 14,9 años; a la vez existen adolescentes que casi han completado su desarrollo genital a los 11,8 años mientras otros no lo logran hasta los 17,8 años.

## **PUBERTAD**

**Variantes Normales:** 

Telarquía Precoz Pubarquía Precoz Menarquía Precoz Trastornos Menstruales

Mamas Pequeñas Mamas Gigantes

**Mamas asimetricas** 

**Ginecomastia** 

. Flujo vaginal

## DESARROLLO CEREBRAL Y NEUROPSICOLOGICO

#### "Síndrome del Adolescente Normal"

- o Búsqueda de si mismo o de la identidad adulta
- o Tendencia grupal
- o Necesidad de intelectualizar y fantasear
- o Evolución sexual desde el autoerotismo hasta la heterosexualidad
- o Actitud social reivindicatoria
- o Conductas perturbadoras
- o Separación progresiva de los padres
- o Constantes fluctuaciones del humor.
- o Crisis religiosas

#### CUIDADOS QUE DEBEN CONOCER

- **▶DIETA BALANCEADA**
- >CONTROL DE PESO
- >EJERCICIO REGULAR
- >DORMIR Y DESCANSAR
- >BUENA PRESENTACION PERSONAL
- >EVITAR EL FUMAR Y CONSUMOS DE DROGAS
- >VISITAS REGULARES AL MEDICO Y ESTOMATÓLOGO
- >EVITAR CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO
- >SEGURIDAD PERSONAL
- > LLENAR LAS NECESIDADES EMOCIONALES

### SERVICIOS DE CALIDAD

\*FORMACION Y CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS

**\*SERVICIOS INTEGRALES PARA ADOLESCENTES** 

\*PARTICIPACION ACTIVA DE LOS Y LAS ADOLESCENTES

