



# Programa de Salud del Adolescente del Estado de São Paulo

## ¿COLPOCITOLOGIA ONCOTICA EN LA ADOLESCENCIA? SÍ NO?

**Albertina Duarte Takiuti, Mayara de Sá Salvato, Mei S. Yau,  
Lelia de Souza Fernandes, Joana Maria Shikanai Kerr,  
Arlindo Frederico Junior, Caio Schlechta Portella,  
Edmundo C. Baracat, Alzira Ciampolini Leal**

*Programa Saúde do Adolescente e Faculdade de Medicina da  
Universidade de São Paulo*

# Un poco de história...



1971 – Consulta externa Infanto-puberal – Prof. Dr Alvaro da Cunha Bastos- Hospital de Clínicas - USP

1986 – Se crea el Programa de salud Integral del adolescente



1988 – Se crea el SUS (integral, multiprofesional e intersectorial )



1990 - Estatuto del niño y del adolescente (ECA)



2005– Ley que efectiva el Programa del adolescente ( n°11.976)

- ✓ Equipo Multiprofesional
- ✓ Servicio público gratuito

# Hoy

- 30 Casas del Adolescente
- Asociaciones con Universidades (USP- Santa Casa, Unicamp, ABC, UNIP, PUC, Anhembi Morumbi e Inst. Sedes Sapientiae)
- Asociaciones con ONGs, Sindicatos
- Capacitación y Treinamiento de Profesionales
- Libros y Articulos
- Participación en Congresos
- Incontables Premios



# Introducción

El cambio en los patrones de la conducta en el grupo de niñas adolescentes, con una disminución de la edad de la primera relación sexual, el aumento del número de parejas sexuales, el embarazo, el tabaquismo, el uso y el tipo de método anticonceptivo, y las infecciones genitales, favorecen y pueden llevar a una mayor probabilidad de infección por el HPV, lo que contribuye a aumentar el riesgo de desarrollar lesiones precancerosas y lesiones cervicales invasivas.

La orientación del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional del Cáncer dirige la realización del Papanicolau a mujeres de 25 a 64 años.



# Objetivo

**Evaluar la importancia de la realización de la Colpocitología en la adolescencia, el conocimiento y los hábitos sexuales en este rango de edad, además de identificar las situaciones que las hacen vulnerables, contribuyendo a la mejora de la prevención y control del cáncer del cuello uterino, haciendo que las personas jóvenes menos susceptibles a este tipo de infección.**



# Metodo

Se analizaron retrospectivamente 620 pruebas colpocitología de los adolescentes entre 13 y 19 años, realizado en la Casa do Adolescente de Pinheiros, en el período de 2010 a 2012.

Fueron 50 adolescentes con diagnóstico de HPV asociados con neoplasia intraepitelial cervical (NIC), los datos fueron recogidos por los registros de la encuesta del perfil y de los factores de riesgo para el cáncer cervical.

Juntos hemos realizado un estudio cualitativo con 10 adolescentes, investigando los sentimientos después del diagnóstico, los cambios de hábitos y la adhesión a el tratamiento.





# RESULTADOS


En la evaluación con respecto a los factores de riesgo para el cáncer cervical:

- Las pacientes tenían una edad media de la menarquia de 11 años y se inició la actividad sexual a los 14 años.
- El número promedio de parejas sexuales fue de 5.
- 86% usan método hormonal y solamente, 14% usaron método de barrera (condón).
- En relación con el embarazo: 6 pacientes (12%) ya estaban embarazadas.





# RESULTADOS



En relación con el tabaquismo y el consumo de alcohol: 11 (22%) de los pacientes reportaron ser fumadores y 42 (84%) reportaron consumir alcohol socialmente.

# CONCLUSIÓN

Se sugiere la implementación de estrategias de prevención y control dirigidas a las adolescentes, incluida la prueba de Papanicolaou para las adolescentes.

El momento del exame es una oportunidad de escuchar la adolescente, reconocer sus vulnerabilidades y ampliar los factores de protección de su proceso desenvolvimiento.





# Gracias

Alzira Ciampolini Leal  
[psicoterapias@gmail.com](mailto:psicoterapias@gmail.com)