



SOCIEDAD URUGUAYA DE PEDIATRÍA

Congreso de los 100 años

8 al 11 de setiembre de 2015 - Parque de Exposiciones LATU

XXX Congreso Uruguayo de Pediatría - I Congreso Integrado de Adolescencia
VIII Jornadas del Pediatra Joven del Conosur

DERIVACIÓN DE NIÑAS, ADOLESCENTES Y CUIDADORAS DE LOS NIÑOS A LA POLICLÍNICA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA UNIDAD GINECOLÓGICA.

Clínica Pediátrica “B”. Departamento de Pediatría.
Facultad de Medicina-UdelaR

Autores: García Gariglio L, Boulé Sehabiaga M,
Mauren Laborde L, Conselo E, Pérez González W.

Introducción

- Unidad de atención de niñas y adolescentes
- Población objetivo
- Oportunidad
- Programa de derivación

Objetivos

- Conocer los motivos de derivación de las niñas y adolescentes tempranas internadas en el hospital a la policlínica de atención de niñas y adolescentes
- Conectar a las cuidadoras adolescentes a los servicios de salud sexual y reproductiva para brindarles las prestaciones básicas en esa área de salud.

Metodología (I)

- **Diseño:** observacional, descriptivo.
- **Período:** 1/3/2013- 1/3/2015.
- **Criterios de inclusión:** <15 años hospitalizadas en área de cuidados moderados del hospital, con patología ginecológica, y cuidadoras adolescentes que no estén conectadas a los servicios de salud sexual y reproductiva.
- **Criterios de exclusión:** cuidadoras controladas en salud y/o conectadas a los servicios de salud sexual y reproductiva en primer nivel de atención

Metodología(II)


- **Variables:** edad, motivo de la derivación, intervención realizada, seguimiento.
- **Análisis de datos:** frecuencias absolutas y relativas para variables cualitativas; medidas de tendencia central y de dispersión para las cuantitativas.
- **Programa Excel 2011.**

Resultados (I)

- Total de hospitalizados : n=2144, 320(13.7%) adolescentes.
- Fueron derivados 35 niñas y 100 adolescentes. Rango de edad: 1mes a 14años. Media 12 años.

Motivos de derivación niñas y adolescentes(I)

n=135



Resultados(II)

- N= 210 cuidadoras. Se derivaron 180 .
- Se realizó control ginecológico y asesoramiento sobre salud sexual y reproductiva.
- Las adolescentes decidieron iniciar medidas anticonceptivas en 110 casos: anticonceptivos orales 76, dispositivo intrauterino 25, implante subdérmico 3.
- Se realizó interrupción voluntaria del embarazo en 3 madres adolescentes.

Discusión

- Predominaron las adolescentes en los casos derivados.
- El principal motivo de derivación fue prevención en salud sexual y reproductiva.
- Se realizó la captación y seguimiento de las cuidadoras de los niños que no habían recibido asesoramiento previo en salud sexual y reproductiva.
- Contrareferencia con el primer nivel de atención.