

# ENCUESTA SOBRE ADICCIONES EN LA CAPV 2017

## *AVANCE DE DATOS*



Septiembre 2018



EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

**SiiS** Centro de Documentación y Estudios  
Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa  
Fundación Egúa-Careaga Fundazioa

# INDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>PRESENTACIÓN Y METODOLOGÍA</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>1. EL CONSUMO DE ALCOHOL</b> .....   | <b>5</b>  |
| 1.1. Prevalencias generales de consumo de alcohol .....                         | 5         |
| 1.2. Edad de inicio de consumo de alcohol .....                                 | 5         |
| 1.3. Frecuencia de consumo de alcohol durante los últimos 12 meses .....        | 6         |
| 1.4. Frecuencia de consumo de alcohol durante los últimos 30 días.....          | 7         |
| 1.5. Tipología de consumo de alcohol en días laborables y fines de semana ..... | 8         |
| 1.6. Frecuencia de borracheras durante los últimos 12 meses.....                | 9         |
| 1.7. Episodios de consumo intensivo .....                                       | 10        |
| 1.8. Consumo bebidas energéticas mezcladas con bebidas alcohólicas .....        | 11        |
| 1.9. Riesgo de adicción al alcohol.....   | 12        |
| 1.10. Problemas asociados al consumo de alcohol u otras drogas .....            | 13        |
| 1.11. Causas de la disminución del consumo de alcohol.....                      | 14        |
| 1.12. Hábitos de consumo de alcohol entre la población de 15 a 34 años .....    | 15        |
| <b>2. EL CONSUMO DE TABACO</b> .....  | <b>17</b> |
| 2.1. Prevalencias generales de consumo de tabaco.....                           | 17        |
| 2.2. Distribución de la población en relación con el tabaco.....                | 17        |
| 2.3. Edad de inicio en el consumo de tabaco .....                               | 18        |
| 2.4. Intensidad del consumo de tabaco.....                                      | 19        |
| 2.5. Tipo de tabaco consumido .....   | 20        |
| 2.6. Disposición e intención de abandono del consumo de tabaco .....            | 21        |
| 2.7. Causas del abandono o disminución del consumo de tabaco.....               | 21        |
| 2.8. Consumo de cigarrillos electrónicos.....                                   | 22        |
| 2.9. Exposición al humo del tabaco .....  | 23        |
| <b>3. EL CONSUMO DE CANNABIS</b> .....  | <b>24</b> |
| 3.1. Prevalencias generales de consumo de cannabis.....                         | 24        |
| 3.2. Edad de inicio en el consumo de cannabis .....                             | 24        |
| 3.3. Frecuencia de consumo de cannabis.....                                     | 25        |
| 3.4. Vía de obtención del cannabis.....   | 26        |
| <b>4. CONSUMO DE OTRAS SUSTANCIAS ILEGALES</b> .....                            | <b>27</b> |
| 4.1. Prevalencias generales de consumo de otras sustancias ilegales .....       | 27        |
| 4.2. Edad de inicio en el consumo de otras sustancias ilegales .....            | 29        |
| 4.3. Consumo de sustancias vía inyectada .....                                  | 30        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>5. CONSUMO DE PSICOFÁRMACOS.....</b>   | <b>31</b> |
| 5.1. Prevalencias generales de consumo de psicofármacos.....  | 31        |
| 5.2. Edad del primer consumo de psicofármacos .....   | 32        |
| <b>6. CONSUMO DE SUSTANCIAS DOPANTES.....</b>   | <b>33</b> |
| 6.1. Prevalencias generales de consumo de sustancias dopantes .....   | 33        |
| 6.2. Edad de inicio del primer consumo de sustancias dopantes.....  | 33        |
| <b>7. JUEGO .....</b>   | <b>34</b> |
| 7.1. Frecuencia de la práctica de distintos tipos de juego.....   | 34        |
| 7.2. Utilización de diferentes vías de acceso al juego .....  | 35        |
| 7.3. Gasto en el último año y cantidad máxima gastada en prácticas de juego.....  | 36        |
| 7.4. Prácticas de juego de riesgo y adicción .....  | 37        |
| <b>8. USO DE INTERNET .....</b>   | <b>39</b> |
| 8.1. Frecuencia de uso de internet .....  | 39        |
| 8.2. Uso de riesgo o problemático de internet.....  | 39        |
| <b>9. PERCEPCIÓN SOCIAL RESPECTO AL CONSUMO DE DROGAS Y VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS .....</b> | <b>41</b> |
| 9.1. Valoración de la gravedad atribuida al consumo de sustancias y a la adicción al juego .....                                | 41        |
| 9.2. Percepción sobre la evolución del consumo de diversas sustancias en los últimos años.....                                  | 42        |
| 9.3. Opinión sobre los problemas que acarrearán diversas pautas de consumo de sustancias y diversas prácticas .....             | 43        |
| 9.4. Accesibilidad de diversas sustancias.....  | 45        |
| 9.5. Cercanía a personas consumidoras y/o con problemas con las drogas .....  | 46        |
| 9.6. Conocimiento y valoración de la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias de 2016.....                    | 47        |
| 9.7. Valoración de ciertas medidas y actuaciones en materia de drogodependencias .....  | 48        |

## PRESENTACIÓN Y METODOLOGÍA

La Encuesta sobre Adicciones en la CAPV es una operación promovida por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco e incluida en el Plan Vasco de Estadística 2014-2017. Esta operación estadística consiste en una encuesta domiciliaria dirigida a conocer la incidencia de diversas adicciones, con y sin sustancia, entre la población vasca de 15 a 74 años, así como la percepción y valoración sobre diversas cuestiones relacionadas con el consumo de drogas y las adicciones.

La primera edición de esta encuesta se realizó en el año 1992 y se ha venido efectuando con una periodicidad bianual hasta el año 2012. Actualmente, su periodicidad es quinquenal, con lo que los resultados de esta edición suponen una actualización de los resultados que se obtuvieron hace cinco años. En términos generales, la encuesta cubre un periodo de 25 años, cuenta ya con doce ediciones y es una de las operaciones en materia de drogas más antigua y consolidada de nuestro entorno.

La muestra utilizada en la presente edición de la Encuesta sobre Adicciones en la CAPV ha sido diseñada por Eustat, a petición de la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. El marco de la muestra está compuesto por la población de 15 a 74 años residente en viviendas familiares de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la encuesta ha sido realizada a una muestra de 2.013 personas. El trabajo de campo ha sido desarrollado por la empresa QUOR entre los meses de noviembre de 2017 y febrero de 2018.

En este documento presenta un avance de los principales resultados de la Encuesta sobre Adicciones en la CAPV del año 2017. Los resultados de cada una de las variables recogidas en este documento se presentan desagregados por sexo y grandes grupos de edad. Asimismo, también se ofrecen resultados desde el punto de vista evolutivo, siempre que las variables lo permiten.

Este avance se estructura en nueve capítulos en función de las principales sustancias o adicciones objeto de análisis. En los primeros seis capítulos se analizan, de forma separada, las cuestiones relacionadas con el consumo de alcohol, tabaco, cannabis, resto de sustancias ilegales, psicofármacos y sustancias dopantes. Asimismo, en los capítulos séptimo y octavo, se analizan diversas prácticas de riesgo relacionadas con el juego y el uso de internet. Por último, el noveno capítulo, planteado de forma transversal al conjunto de las sustancias consideradas, ofrece los resultados obtenidos en la encuesta en relación a la percepción social del consumo de drogas en la CAPV y la valoración que la ciudadanía hace de las políticas desarrolladas al respecto.

En cada uno de los capítulos se hace referencia, principalmente, a las prevalencias de consumos generales (es decir, número o proporción de personas que declaran consumir o haber consumido cada sustancia), ya sea a lo largo de la vida, en los últimos 12 meses, últimos 30 días o de forma diaria; la distribución de la población en relación al consumo; la edad de inicio en el consumo; las frecuencias de consumo y, en su caso, las cantidades de consumo. Tal y como se ha mencionado previamente, cada una de las variables ofrecidas se ha analizado en función de las características sociodemográficas básicas de la persona encuestada, concretamente, el sexo (hombres y mujeres) y la edad. Para esta última variable se ha optado por diferenciar dos grandes grupos de edad 15-34 y 35-74 años.

Se ha prestado especial atención al análisis evolutivo, mostrando, en la medida de lo posible, los datos desde el inicio de la serie Euskadi y Drogas. A pesar de las dificultades que suponen los cambios que se aplican sucesivamente en la estructura del cuestionario, una de las principales fortalezas de la serie Euskadi y Drogas reside en la posibilidad de analizar el fenómeno a largo plazo. Para ello, se ha recurrido a las bases de datos correspondientes a las diferentes ediciones de la encuesta. En los casos en los que no aparecen determinados años se debe a que no se encuentra disponible la información en esa edición.

## 1. EL CONSUMO DE ALCOHOL

### 1.1. Prevalencias generales de consumo de alcohol

**Tabla 1. Prevalencias generales de consumo de alcohol por sexo y grupos de edad. 2017 (%)**

|                         | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|-------------------------|--------|-------|----------------|-------|-------|
|                         | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Alguna vez en la vida   | 95,3   | 91,2  | 90,9           | 94,0  | 93,2  |
| En los últimos 12 meses | 86,0   | 76,4  | 82,7           | 80,7  | 81,2  |
| En los últimos 30 días  | 78,0   | 65,1  | 70,8           | 71,7  | 71,5  |
| A diario*               | 18,9   | 7,3   | 2,0            | 16,6  | 13,1  |

\*Se considera consumo diario el consumo de alcohol realizado a diario durante los últimos 30 días.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 2. Evolución de las prevalencias generales de consumo de alcohol (%)**

|                         | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2017 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alguna vez en la vida   | --   | 95,6 | 94,2 | 88,8 | 94,8 | 91,7 | 90,8 | 86,9 | 93,2 |
| En los últimos 12 meses | --   | 82,7 | 80,5 | 76,2 | 83,4 | 78,6 | 77,1 | 73,5 | 81,2 |
| En los últimos 30 días  | 70,6 | --   |      | 69,1 | 73,8 | 68,3 | 65,3 | 64,9 | 71,5 |
| A diario                | 19,6 | 20,9 | 16,4 | 17,9 | 18,5 | 15,6 | 15,4 | 12,2 | 13,1 |

\*Se considera consumo diario el consumo de alcohol realizado a diario durante los últimos 30 días.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

### 1.2. Edad de inicio de consumo de alcohol

**Tabla 3. Distribución de la edad de inicio en el consumo de alcohol. 2017 (%)**

|                             | Número    | Distribución sobre la población total | Distribución sobre la población ha probado el alcohol |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|---|
| Nunca ha probado el alcohol | 112.694   | 6,8                                   | --  |
| Ha consumido alguna vez:    | 1.549.530 | 93,2                                  | 100,0   |
| -15 años o menos            | 527.430   | 31,7                                  | 34,0  |
| -Entre 16 y 17 años         | 530.192   | 31,9                                  | 34,2  |
| -18 años o más              | 491.907   | 29,6                                  | 31,7  |
| Total                       | 1.662.224 | 100,0                                 | --  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 4. Distribución de la edad de inicio en el consumo de alcohol entre la población que ha consumido alcohol a lo largo de su vida por sexo y edad. 2017 (% verticales)**

|                    | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|--------------------|--------|-------|----------------|-------|-------|
|                    | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| 15 años o menos    | 39,1   | 28,8  | 50,7           | 28,9  | 34,0  |
| Entre 16 y 17 años | 35,4   | 33,0  | 38,1           | 33,0  | 34,2  |
| 18 años o más      | 25,5   | 38,2  | 11,1           | 38,1  | 31,7  |
| Total              | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |

Nota: las respuestas expuestas en esta tabla están calculadas sobre el 93,2% de la muestra, que se corresponde con la proporción de la población que ha consumido alcohol alguna vez.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 5. Edad media de inicio en el consumo de alcohol por sexo y grupos de edad. 2017 (%)**

|                   | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|-------------------|--------|-------|----------------|-------|-------|
|                   | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Media             | 16,2   | 17,5  | 15,5           | 17,2  | 16,8  |
| Mediana           | 16     | 17    | 15             | 16    | 16    |
| Desviación típica | 2,48   | 4,19  | 1,77           | 3,77  | 3,49  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 6. Evolución de la distribución de la edad de inicio en el alcohol entre la población que ha consumido alcohol a lo largo de su vida. (%)**

|                      | 2000  | 2002  | 2004  | 2006  | 2008  | 2010  | 2012  | 2017  |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Grupos</b>        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15 años o menos      | 34,7  | 41,6  | 38,6  | 36,2  | 31,3  | 33,3  | 34,9  | 34,0  |
| Entre 16 y 17 años   | 23,4  | 23,6  | 27,5  | 28,7  | 26,6  | 29,4  | 32,1  | 34,2  |
| 18 años o más        | 36,5  | 30,1  | 31,7  | 34,0  | 40,6  | 35,2  | 29,8  | 31,7  |
| NS/NC                | 5,4   | 4,7   | 2,2   | 1,0   | 1,5   | 2,1   | 3,3   | 0,0   |
| Total                | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| <b>Media</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Edad media de inicio | 17,1  | 16,6  | 16,7  | 16,9  | 17,3  | 17,1  | 16,4  | 16,8  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

### 1.3. Frecuencia de consumo de alcohol durante los últimos 12 meses

**Tabla 7. Distribución entre la población total de la frecuencia de consumo de alcohol en los últimos 12 meses. 2017**

|   | Número    | Distribución sobre la población total | Distribución sobre la población que ha consumido alcohol últimos 12 meses |
|---|-----------|---------------------------------------|---|
| No ha probado el alcohol                        | 112.694   | 6,8                                   | --  |
| No ha consumido alcohol en los últimos 12 meses | 200.314   | 12,1                                  | --  |
| Ha consumido alcohol en los últimos 12 meses:   | 1.349.216 | 81,2                                  | 100,0   |
| - <i>Todos los días</i>                         | 230.328   | 13,9                                  | 17,1  |
| - <i>De 5 a 6 días a la semana</i>              | 21.406    | 1,3                                   | 1,6   |
| - <i>4 días a la semana</i>                     | 58.755    | 3,5                                   | 4,4   |
| - <i>3 días a la semana</i>                     | 108.023   | 6,5                                   | 8,0   |
| - <i>De 1 a 2 días a la semana</i>              | 449.645   | 27,1                                  | 33,3  |
| - <i>Una vez cada 15 días</i>                   | 160.242   | 9,6                                   | 11,9  |
| - <i>Una vez al mes</i>                         | 128.924   | 7,8                                   | 9,6   |
| - <i>Menos de una vez al mes</i>                | 191.893   | 11,5                                  | 14,2  |
| Total   | 1.662.224 | 100,0                                 | --  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 8. Distribución entre la población de la frecuencia de consumo de alcohol en los últimos 12 meses por sexo y grupos de edad. 2017**

|  | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|--|--------|-------|----------------|-------|-------|
|  | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| No ha probado el alcohol o no ha consumido en los últimos 12 meses | 14,0   | 23,6  | 17,3           | 19,3  | 18,8  |
| Ha consumido en los últimos 12 meses:                              | 86,0   | 76,4  | 82,7           | 80,7  | 81,2  |
| - <i>Todos los días</i>  | 20,3   | 7,5   | 1,8            | 17,7  | 13,9  |
| - <i>De 5 a 6 días a la semana</i>                                 | 1,6    | 1,0   | 0,7            | 1,5   | 1,3   |
| - <i>4 días a la semana</i>  | 4,4    | 2,7   | 2,4            | 3,9   | 3,5   |
| - <i>3 días a la semana</i>  | 8,6    | 4,4   | 8,8            | 5,8   | 6,5   |
| - <i>De 1 a 2 días a la semana</i>                                 | 28,0   | 26,1  | 30,6           | 25,9  | 27,1  |
| - <i>Una vez cada 15 días</i>                                      | 8,5    | 10,7  | 14,3           | 8,2   | 9,6   |
| - <i>Una vez al mes</i>  | 7,0    | 8,5   | 10,3           | 6,9   | 7,8   |
| - <i>Menos de una vez al mes</i>                                   | 7,6    | 15,4  | 13,9           | 10,8  | 11,5  |
| Total  | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

#### 1.4. Frecuencia de consumo de alcohol durante los últimos 30 días

**Tabla 9. Distribución entre la población total de la frecuencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días. 2017**

|  | Número    | Distribución de la población total |
|--|-----------|------------------------------------|
| <b>Frecuencia de consumo días laborables (lunes a jueves)</b>    |           |                                    |
| Todos los días   | 228.093   | 13,7                               |
| 3 días por semana  | 44.185    | 2,7                                |
| 2 días por semana  | 76.015    | 4,6                                |
| 1 día por semana   | 150.463   | 9,1                                |
| Menos de 1 día por semana  | 101.656   | 6,1                                |
| Ningún día   | 1.061.812 | 63,9                               |
| Total  | 1.662.224 | 100,0                              |
| <b>Frecuencia de consumo fines de semana (viernes a domingo)</b> |           |                                    |
| Todos los fines de semana  | 570.558   | 34,3                               |
| 3 fines de semana  | 108.015   | 6,5                                |
| 2 fines de semana  | 243.610   | 14,7                               |
| 1 fin de semana  | 238.722   | 14,4                               |
| Ningún fin de semana   | 501.319   | 30,2                               |
| Total  | 1.662.224 | 100,0                              |

Nota: las proporciones recogidas en esta tabla están calculadas sobre el total de la población. Dentro de ningún día o de ningún fin de semana, están incluidas también aquellas personas que no han probado el alcohol o no han consumido nada de alcohol en los últimos 12 meses.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 10. Distribución entre la población total de la frecuencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días por sexo y grupos de edad. 2017**

|  | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|--|--------|-------|----------------|-------|-------|
|  | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| <b>Frecuencia de consumo días laborables (lunes a jueves)</b>    |        |       |                |       |       |
| Todos los días   | 20,2   | 7,4   | 1,9            | 17,5  | 13,7  |
| 3 días por semana  | 3,7    | 1,7   | 1,4            | 3,1   | 2,7   |
| 2 días por semana  | 5,8    | 3,4   | 4,4            | 4,6   | 4,6   |
| 1 día por semana   | 10,3   | 7,8   | 13,8           | 7,6   | 9,1   |
| Menos de 1 día por semana  | 29,3   | 39,9  | 36,7           | 34,0  | 34,6  |
| Ningún día   | 30,8   | 39,9  | 41,9           | 33,3  | 35,4  |
| Total  | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |
| <b>Frecuencia de consumo fines de semana (viernes a domingo)</b> |        |       |                |       |       |
| Todos los fines de semana  | 42,6   | 26,1  | 23,0           | 37,9  | 34,3  |
| 3 fines de semana  | 6,2    | 6,8   | 9,7            | 5,5   | 6,5   |
| 2 fines de semana  | 14,8   | 14,5  | 18,8           | 13,4  | 14,7  |
| 1 fin de semana  | 12,3   | 16,4  | 17,9           | 13,2  | 14,4  |
| Ningún fin de semana   | 24,0   | 36,2  | 30,6           | 30,0  | 30,2  |
| Total  | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |

Nota: las proporciones recogidas en esta tabla están calculadas sobre el total de la población.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

### 1.5. Tipología de consumo de alcohol en días laborables y fines de semana

**Tabla 11. Distribución de la población total en función de la tipología de consumo de alcohol en días laborables y fines de semana. 2017**

|  | Número    | Distribución de la población total |
|--|-----------|------------------------------------|
| <b>Tipología de consumo en días laborables</b> |           |                                    |
| Abstemio                                       | 1.105.453 | 66,5                               |
| Casi abstemio                                  | 464.115   | 27,9                               |
| Poco bebedor                                   | 86.188    | 5,2                                |
| Bebedor excesivo                               | 6.468     | 0,4                                |
| Bebedor de riesgo                              | 0         | 0,0                                |
| Total  | 1.662.224 | 100,0                              |
| <b>Tipología de consumo en fines de semana</b> |           |                                    |
| Abstemio                                       | 559.384   | 33,7                               |
| Casi abstemio                                  | 575.502   | 34,6                               |
| Poco bebedor                                   | 392.776   | 23,6                               |
| Bebedor excesivo                               | 108.234   | 6,5                                |
| Bebedor de riesgo                              | 26.328    | 1,6                                |
| Total  | 1.662.224 | 100,0                              |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.



**Tabla 12. Distribución de la población total en función de la tipología de consumo de alcohol en días laborables y fines de semana por sexo y grupos de edad. 2017 (%)**

|  | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|--|--------|-------|----------------|-------|-------|
|  | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| <b>Tipología de consumo en días laborables</b> |        |       |                |       |       |
| Abstemio                                       | 55,9   | 76,9  | 75,1           | 63,8  | 66,5  |
| Casi abstemio                                  | 34,5   | 21,4  | 19,7           | 30,5  | 27,9  |
| Poco bebedor                                   | 9,0    | 1,4   | 4,9            | 5,3   | 5,2   |
| Bebedor excesivo                               | 0,6    | 0,2   | 0,4            | 0,4   | 0,4   |
| Bebedor de riesgo                              | 0,0    | 0,0   | 0,0            | 0,0   | 0,0   |
| Total  | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |
| <b>Tipología de consumo en fines de semana</b> |        |       |                |       |       |
| Abstemio                                       | 27,0   | 40,2  | 33,7           | 33,6  | 33,7  |
| Casi abstemio                                  | 30,5   | 38,7  | 21,4           | 38,8  | 34,6  |
| Poco bebedor                                   | 31,4   | 16,0  | 27,4           | 22,4  | 23,6  |
| Bebedor excesivo                               | 8,8    | 4,3   | 11,8           | 4,8   | 6,5   |
| Bebedor de riesgo                              | 2,4    | 0,8   | 5,7            | 0,3   | 1,6   |
| Total  | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 13. Evolución de la distribución de la población total en función de la tipología de consumo de alcohol en días laborables y fines de semana (%)**

|  | 1992  | 1994  | 1996  | 1998  | 2000  | 2002  | 2004  | 2006  | 2008  | 2010  | 2012  | 2017  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Tipología de consumo en días laborables</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Abstemio                                       | 71,3  | 69,2  | 72,7  | 74,6  | 69,8  | 70,1  | 71,0  | 68,1  | 67,2  | 74,1  | 69,1  | 66,5  |
| Casi abstemio                                  | 18,5  | 19,2  | 19,6  | 20,3  | 22,0  | 21,6  | 18,7  | 24,2  | 22,2  | 19,2  | 20,8  | 27,9  |
| Poco bebedor                                   | 7,2   | 10,6  | 6,6   | 4,6   | 6,7   | 6,7   | 8,4   | 6,8   | 8,7   | 5,2   | 7,7   | 5,2   |
| Bebedor excesivo                               | 2,2   | 0,9   | 0,9   | 0,5   | 1,2   | 1,4   | 1,6   | 1,0   | 1,6   | 1,3   | 2,0   | 0,4   |
| Bebedor de riesgo                              | 0,8   | 0,1   | 0,2   | 0,1   | 0,2   | 0,1   | 0,3   | 0,0   | 0,4   | 0,2   | 0,5   | 0,0   |
| Total  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| <b>Tipología de consumo en fines de semana</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Abstemio                                       | 56,9  | 53,4  | 54,0  | 59,0  | 53,5  | 52,4  | 43,2  | 35,0  | 32,6  | 37,4  | 35,8  | 33,7  |
| Casi abstemio                                  | 15,2  | 18,4  | 18,2  | 19,5  | 27,5  | 25,6  | 18,7  | 23,0  | 30,0  | 31,4  | 30,9  | 34,6  |
| Poco bebedor                                   | 14,2  | 18,5  | 16,9  | 16,1  | 15,3  | 16,1  | 20,7  | 28,1  | 23,6  | 21,5  | 21,9  | 23,6  |
| Bebedor excesivo                               | 9,2   | 6,4   | 7,9   | 4,0   | 3,1   | 4,6   | 11,9  | 10,2  | 9,6   | 7,1   | 8,1   | 6,5   |
| Bebedor de riesgo                              | 4,5   | 3,3   | 3,1   | 1,3   | 0,5   | 1,3   | 5,5   | 3,7   | 4,2   | 2,5   | 3,2   | 1,6   |
| Total  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

## 1.6. Frecuencia de borracheras durante los últimos 12 meses

**Tabla 14. Distribución de la población total en función de la frecuencia de borracheras. 2017 (%)**

|   | Número    | Distribución sobre la población total | Distribución sobre la población que ha consumido últimos 12 meses |
|---|-----------|---------------------------------------|---|
| Nunca ha probado el alcohol                             | 112.694   | 6,8                                   | --  |
| Ha probado pero no ha consumido en los últimos 12 meses | 200.314   | 12,1                                  | --  |
| Ha consumido en los últimos 12 meses:                   | 1.349.216 | 81,2                                  | 100,0   |
| -No se ha emborrachado                                  | 951.478   | 57,2                                  | 70,5  |
| -Se ha emborrachado entre 1 y 6 veces al año            | 288.231   | 17,3                                  | 21,4  |
| -Se ha emborrachado entre 7 y 12 veces al año           | 50.654    | 3,0                                   | 3,8   |
| -Se ha emborrachado más de 12 veces al año              | 58.853    | 3,5                                   | 4,4   |
| Total   | 1.662.224 | 100,0                                 | --  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 15. Frecuencia de borracheras entre la población que ha consumido alcohol en los últimos 12 meses por sexo y grupos de edad. 2017 (%)**

|  | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|--|--------|-------|----------------|-------|-------|
|  | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| No se ha emborrachado                        | 63,6   | 78,2  | 36,4           | 81,6  | 70,5  |
| Se ha emborrachado entre 1 y 6 veces al año  | 25,2   | 17,1  | 40,7           | 15,1  | 21,4  |
| Se ha emborrachado entre 7 y 12 veces al año | 5,5    | 1,9   | 9,8            | 1,8   | 3,8   |
| Se ha emborrachado más de 12 veces al año    | 5,7    | 2,8   | 13,1           | 1,5   | 4,4   |
| Total  | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |

Nota: los porcentajes recogidos en esta tabla están calculados sobre el 81,2% de la muestra, que se corresponde con las personas que han consumido alcohol en los últimos 12 meses.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 16. Evolución de la distribución de la población total en función de la frecuencia de borracheras en los últimos 12 meses (%)**

|                       | 2004  | 2006  | 2008  | 2010  | 2012  | 2017  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| No se ha emborrachado | 70,1  | 72,7  | 76,8  | 81,3  | 81,3  | 76,1  |
| Entre 1 y 12 veces    | 19,7  | 19,2  | 19,0  | 13,2  | 15,0  | 20,4  |
| Más de 12 veces       | 9,9   | 7,1   | 3,8   | 2,5   | 2,2   | 3,5   |
| NS/NC                 | 0,4   | 1,0   | 0,5   | 2,9   | 1,5   | 0,0   |
| Total                 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Nota: las proporciones están calculadas sobre el conjunto de la población. En la categoría 'no se ha emborrachado' se incluyen, por tanto, las personas que no han probado el alcohol, las que no han consumido nada en los últimos 12 meses y las que han consumido alcohol en los últimos 12 meses pero no se han emborrachado.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

## 1.7. Episodios de consumo intensivo

**Tabla 17. Distribución de la población en función de la frecuencia de consumo intensivo\* de alcohol a lo largo de los últimos 30 días. 2017 (%)**

|  | Número    | Distribución sobre la población total | Distribución sobre la población que ha consumido últimos 30 días |
|--|-----------|---------------------------------------|--|
| Nunca ha probado el alcohol                  | 112.694   | 6,8                                   | --   |
| No ha consumido en los últimos 30 días       | 361.010   | 21,8                                  |  |
| Ha consumido en los últimos 30 días:         | 1.188.520 | 71,5                                  | 100,0  |
| -No ha tenido episodios de consumo intensivo | 1.005.395 | 60,5                                  | 84,6   |
| -Entre 1 y 2 veces al mes                    | 130.497   | 7,9                                   | 11,0   |
| -Entre 3 y 4 veces al mes                    | 28.696    | 1,7                                   | 2,4  |
| -5 o más veces al mes                        | 23.933    | 1,4                                   | 2,0  |
| Total  | 1.662.224 | 100,0                                 | --   |

Nota: se consideran episodios de consumo intensivo, en el caso de los hombres, el número de días en los que se han consumido 5 o más bebidas alcohólicas en la misma ocasión y, en el caso de las mujeres, el número de días en los que se han consumido 4 o más bebidas alcohólicas en la misma ocasión.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 18. Distribución de la población que ha consumido alcohol en los últimos 30 días por la frecuencia de consumo intensivo por sexo y grupos de edad. 2017 (%)**

|   | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|---|--------|-------|----------------|-------|-------|
|   | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| No ha tenido episodios de consumo intensivo | 83,4   | 86,0  | 71,2           | 88,8  | 84,6  |
| Entre 1 y 2 veces al mes                    | 11,0   | 11,0  | 23,3           | 7,1   | 11,0  |
| Entre 3 y 4 veces al mes                    | 2,8    | 1,9   | 3,8            | 2,0   | 2,4   |
| 5 o más veces al mes                        | 2,8    | 1,1   | 1,6            | 2,1   | 2,0   |
| Total                                       | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |

Nota: las proporciones recogidas en esta tabla están calculadas sobre el 71,5% de la muestra, que se corresponde con la población que ha consumido alcohol en los últimos 30 días.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

### 1.8. Consumo bebidas energéticas mezcladas con bebidas alcohólicas

**Tabla 19. Distribución de la población en función del consumo de bebidas energéticas mezcladas con bebidas alcohólicas\* en los últimos 30 días. 2017 (%)**

|  | Número    | Distribución sobre la población total | Distribución sobre la población que ha consumido últimos 30 días |
|--|-----------|---------------------------------------|--|
| Nunca ha probado el alcohol            | 112.694   | 6,8                                   | -  |
| No ha consumido en los últimos 30 días | 361.010   | 21,8                                  | -  |
| Ha consumido en los últimos 30 días:   | 1.188.520 | 71,5                                  | 100,0  |
| -Sí                                    | 28.020    | 1,7                                   | 2,4  |
| -No                                    | 1.160.500 | 69,8                                  | 97,6   |
| Total                                  | 1.662.224 | 100,0                                 | -  |

\*¿Ha tomado en los últimos 30 días bebidas energéticas (Red Bull, Burn, Monster...) mezcladas con bebidas alcohólicas? Conteste "No" si lo único que hizo fue dar un sorbo o probar de la bebida de otra persona.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 20. Prevalencia de consumo de bebidas energéticas mezcladas con bebidas alcohólicas en los últimos 30 días por sexo y grupos de edad. 2017 (%)**

|  | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|--|--------|-------|----------------|-------|-------|
|  | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol | 2,3    | 1,1   | 5,7            | 0,4   | 1,7   |

Nota: las proporciones recogidas en esta tabla están calculadas sobre el total de la población.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

## 1.9. Riesgo de adicción al alcohol

**Tabla 21. Distribución de la población en función del riesgo de adicción al alcohol\*. 2017 (%)**

|   | Número    | Distribución sobre la población total | Distribución sobre la población que ha consumido alcohol en los últimos 12 meses |
|---|-----------|---------------------------------------|--|
| Nunca ha probado el alcohol                             | 112.694   | 6,8                                   | -  |
| Ha probado pero no ha consumido en los últimos 12 meses | 200.314   | 12,1                                  | -  |
| Ha consumido en los últimos 12 meses:                   | 1.349.216 | 81,2                                  | 100  |
| - <i>Bebedor social</i>                                 | 1.273.030 | 76,6                                  | 94,4   |
| - <i>Consumo de riesgo</i>                              | 54.377    | 3,3                                   | 4,0  |
| - <i>Consumo perjudicial</i>                            | 19.230    | 1,2                                   | 1,4  |
| - <i>Dependencia alcohólica</i>                         | 2.579     | 0,2                                   | 0,2  |
| Total   | 1.662.224 | 100,0                                 | -  |

\* El riesgo de adicción al alcohol está calculado en base al test CAGE, un método de *screening* basado en cuatro preguntas y dos categorías de respuesta binaria (sí o no) para discriminar personas con una dependencia respecto al alcohol.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 22. Distribución de la población total en función del riesgo de adicción al alcohol\* por sexo y grupos de edad. 2017 (%)**

|   | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|---|--------|-------|----------------|-------|-------|
|   | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| No ha probado o no ha consumido en los últimos 12 meses | 14,0   | 23,6  | 17,3           | 19,3  | 18,8  |
| Bebedor social  | 79,1   | 74,1  | 75,9           | 76,8  | 76,6  |
| Consumo de riesgo                                       | 5,0    | 1,6   | 4,8            | 2,8   | 3,3   |
| Consumo perjudicial                                     | 1,5    | 0,8   | 1,9            | 0,9   | 1,2   |
| Dependencia alcohólica                                  | 0,3    | 0,0   | 0,1            | 0,2   | 0,2   |
| Total   | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 23. Evolución de la distribución de la población en función del riesgo de adicción al alcohol (%)**

|   | 2012  | 2017  |
|---|-------|-------|
| No ha probado o no ha consumido en los últimos 12 meses | 24,4  | 18,8  |
| Bebedor social  | 72,1  | 76,6  |
| Consumo de riesgo                                       | 1,6   | 3,3   |
| Consumo perjudicial                                     | 1,4   | 1,2   |
| Dependencia alcohólica                                  | 0,4   | 0,2   |
| Total   | 100,0 | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

### 1.10. Problemas asociados al consumo de alcohol u otras drogas

**Tabla 24. Distribución de la población en función de si alguna vez ha sufrido diversos problemas bajo la influencia del consumo de alcohol u otras drogas. 2017 (%)**

|  | No ha probado el alcohol | Ha probado el alcohol |      |       | Total |
|--|--------------------------|-----------------------|------|-------|-------|
|  |                          | Sí                    | No   | NS/NC |       |
| Discusiones o peleas con desconocidos  | 6,8                      | 5,2                   | 87,8 | 0,2   | 100,0 |
| Discusiones o peleas con familiares  | 6,8                      | 2,8                   | 90,3 | 0,2   | 100,0 |
| Discusiones o peleas con amistades   | 6,8                      | 6,0                   | 87,1 | 0,1   | 100,0 |
| Caídas, golpes involuntarios   | 6,8                      | 6,3                   | 86,8 | 0,1   | 100,0 |
| Accidentes de tráfico  | 6,8                      | 0,2                   | 92,9 | 0,1   | 100,0 |
| Accidentes laborales   | 6,8                      | 0,0                   | 93,1 | 0,1   | 100,0 |
| Relaciones sexuales sin protección   | 6,8                      | 3,0                   | 90,0 | 0,3   | 100,0 |
| Relaciones sexuales no deseadas  | 6,8                      | 0,5                   | 92,5 | 0,2   | 100,0 |
| Algún episodio de etilismo agudo por el que ha tenido que ser atendido/a médicamente | 6,8                      | 0,2                   | 92,9 | 0,1   | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 25. Prevalencias entre la población total de diversos problemas bajo la influencia del consumo de alcohol u otras drogas por sexo y grupos de edad. 2017 (%)**

|  | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|--|--------|-------|----------------|-------|-------|
|  | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Discusiones o peleas con desconocidos  | 7,2    | 3,3   | 14,2           | 2,3   | 5,2   |
| Discusiones o peleas con familiares  | 3,4    | 2,1   | 4,5            | 2,2   | 2,8   |
| Discusiones o peleas con amistades   | 8,0    | 4,0   | 16,9           | 2,5   | 6,0   |
| Caídas, golpes involuntarios   | 7,6    | 4,9   | 17,7           | 2,6   | 6,3   |
| Accidentes de tráfico  | 0,4    | 0,0   | 0,4            | 0,2   | 0,2   |
| Accidentes laborales   | 0,0    | 0,0   | 0,1            | 0,0   | 0,0   |
| Relaciones sexuales sin protección   | 4,4    | 1,6   | 6,2            | 1,9   | 3,0   |
| Relaciones sexuales no deseadas  | 1,0    | 0,0   | 1,4            | 0,2   | 0,5   |
| Algún episodio de etilismo agudo por el que ha tenido que ser atendido/a médicamente | 0,4    | 0,1   | 0,8            | 0,1   | 0,2   |
| Discusiones o peleas con desconocidos  | 2,6    | 0,4   | 3,4            | 0,9   | 1,5   |

Nota: las prevalencias generales recogidas en esta tabla están calculadas sobre el total de la población.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

### 1.11. Causas de la disminución del consumo de alcohol

**Tabla 26. Distribución de la población en función del abandono o disminución del consumo de alcohol. 2017**

|   | Número    | Distribución sobre la población total |
|---|-----------|---------------------------------------|
| Nunca ha probado el alcohol                             | 112.694   | 6,8                                   |
| Ha probado pero no ha consumido en los últimos 12 meses | 200.314   | 12,1                                  |
| Ha probado y ha consumido en los últimos 12 meses:      | 1.349.216 | 81,2                                  |
| -Bebe más que hace 1 año                                | 54.074    | 3,3                                   |
| -Bebe menos que hace 1 año                              | 366.603   | 22,1                                  |
| -Bebe lo mismo que hace un año                          | 928.539   | 55,9                                  |
| Total   | 1.662.224 | 100,0                                 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 27. Grado de influencia de diversas causas en la disminución del consumo de alcohol en los últimos 12 meses. 2017 (%)**

|  | Nada | Poco | Bastante | Mucho | Total |
|--|------|------|----------|-------|-------|
| Recomendación médica                         | 79,2 | 5,9  | 9,5      | 5,4   | 100,0 |
| Presiones o problemas en la familia          | 87,5 | 4,7  | 4,4      | 3,4   | 100,0 |
| Presiones o problemas con los amigos         | 91,3 | 1,5  | 5,1      | 2,1   | 100,0 |
| Noviazgo, matrimonio o convivencia en pareja | 85,8 | 5,1  | 5,4      | 3,7   | 100,0 |
| Embarazo                                     | 87,3 | 0,7  | 2,5      | 9,5   | 100,0 |
| Crianza de los hijos e hijas                 | 83,8 | 1,7  | 5,7      | 8,8   | 100,0 |
| Comenzar a trabajar o cambiar de trabajo     | 86,4 | 4,4  | 5,5      | 3,8   | 100,0 |
| Problemas de salud                           | 76,4 | 8,2  | 8,9      | 6,6   | 100,0 |
| Cambio de residencia                         | 91,4 | 4,0  | 2,4      | 2,1   | 100,0 |
| Problemas en el trabajo                      | 90,3 | 3,9  | 1,9      | 3,9   | 100,0 |
| Cambio de cuadrilla                          | 91,0 | 3,2  | 3,6      | 2,2   | 100,0 |

\*Las respuestas expuestas en esta tabla están calculadas sobre el 22,1% de la muestra. Recogen las declaraciones de aquellas personas a lo largo del último año declaran que su consumo se ha reducido.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 28. Grado de influencia de diversas causas en la disminución del consumo de alcohol en los últimos 12 meses. 2017**  
(% de las personas que declaran que esas causas han influido mucho o bastante)

|  | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|--|--------|-------|----------------|-------|-------|
|  | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Recomendación médica                         | 16,8   | 12,4  | 9,3            | 17,5  | 14,9  |
| Presiones o problemas en la familia          | 8,2    | 7,2   | 5,9            | 8,7   | 7,8   |
| Presiones o problemas con los amigos         | 7,2    | 7,2   | 5,4            | 8,1   | 7,2   |
| Noviazgo, matrimonio o convivencia en pareja | 9,6    | 8,6   | 7,7            | 9,8   | 9,2   |
| Embarazo                                     | 6,6    | 19,1  | 11,1           | 12,5  | 12,0  |
| Crianza de los hijos e hijas                 | 11,9   | 17,9  | 10,1           | 16,6  | 14,5  |
| Comenzar a trabajar o cambiar de trabajo     | 9,6    | 8,8   | 11,1           | 8,4   | 9,2   |
| Problemas de salud                           | 16,7   | 13,8  | 9,1            | 18,5  | 15,5  |
| Cambio de residencia                         | 5,1    | 3,8   | 1,8            | 5,9   | 4,6   |
| Problemas en el trabajo                      | 6,9    | 4,4   | 1,0            | 8,0   | 5,8   |
| Cambio de cuadrilla                          | 5,5    | 6,1   | 4,5            | 6,4   | 5,8   |

\*Las respuestas expuestas en esta tabla están calculadas sobre el 22,1% de la muestra, que se corresponde con aquellas personas que a lo largo del último año declaran que su consumo se ha reducido.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

### 1.12. Hábitos de consumo de alcohol entre la población de 15 a 34 años

**Tabla 29. Distribución de la población de 15 a 34 años en función de los lugares de compra de bebidas alcohólicas. 2017 (%)**

|                 | No ha probado el alcohol | Ha probado el alcohol |      |       | Total |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|------|-------|-------|
|                 |                          | Sí                    | No   | NS/NC |       |
| Bares           | 9,1                      | 66,4                  | 24,4 | 0,1   | 100,0 |
| Discotecas      | 9,1                      | 31,8                  | 59,1 | 0,1   | 100,0 |
| Supermercados   | 9,1                      | 59,7                  | 31,1 | 0,1   | 100,0 |
| Otros comercios | 9,1                      | 18,4                  | 72,4 | 0,1   | 100,0 |
| De casa         | 9,1                      | 9,0                   | 81,9 | 0,1   | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 30. Distribución de la población de 15 a 34 años en función de los lugares de compra de bebidas alcohólicas por sexo y grupos de edad. 2017 (% de personas que responden que compran en esos lugares)**

|                 | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|-----------------|--------|-------|----------------|-------|-------|
|                 | Hombre | Mujer | 15-24          | 25-34 |       |
| Bares           | 67,6   | 65,2  | 58,0           | 73,5  | 66,4  |
| Discotecas      | 35,0   | 28,5  | 37,0           | 27,4  | 31,8  |
| Supermercados   | 60,8   | 58,6  | 61,5           | 58,2  | 59,7  |
| Otros comercios | 21,5   | 15,4  | 25,9           | 12,1  | 18,4  |
| De casa         | 9,2    | 8,7   | 9,8            | 8,3   | 9,0   |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 31. Distribución de la población de 15 a 34 años en función de los lugares de consumo de bebidas alcohólicas. 2017 (%)**

|            | No ha probado el alcohol | Ha probado el alcohol |      |       | Total |
|------------|--------------------------|-----------------------|------|-------|-------|
|            |                          | Sí                    | No   | NS/NC |       |
| Bares      | 9,1                      | 76,9                  | 14,0 | 0,1   | 100,0 |
| Discotecas | 9,1                      | 36,7                  | 54,2 | 0,1   | 100,0 |
| Lonjas     | 9,1                      | 19,8                  | 71,0 | 0,1   | 100,0 |
| Calle      | 9,1                      | 33,0                  | 57,9 | 0,0   | 100,0 |
| Casa       | 9,1                      | 35,2                  | 55,7 | 0,0   | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 32. Distribución de la población de 15 a 34 años en función de los lugares de consumo de bebidas alcohólicas por sexo y grupos de edad. 2017 (% de personas que responden que consumen en esos lugares)**

|            | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|------------|--------|-------|----------------|-------|-------|
|            | Hombre | Mujer | 15-24          | 25-34 |       |
| Bares      | 79,1   | 74,5  | 68,9           | 83,5  | 76,9  |
| Discotecas | 41,4   | 31,9  | 43,5           | 30,9  | 36,7  |
| Lonjas     | 23,7   | 15,9  | 29,0           | 12,0  | 19,8  |
| Calle      | 34,7   | 31,3  | 50,4           | 18,3  | 33,0  |
| Casa       | 37,0   | 33,4  | 22,6           | 45,8  | 35,2  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 33. Distribución de la población de 15 a 34 años en función de la frecuencia de botellón en la calle en los últimos 12 meses. 2017**

|  | Número  | Distribución sobre la población 15-34 años | Distribución sobre la población 15-34 años que ha probado el alcohol |
|--|---------|--|--|
| Nunca ha probado el alcohol              | 36.425  | 9,1  | --   |
| Ha probado el alcohol:                   | 364.649 | 90,9                                       | 100,0  |
| -No ha hecho botellón                    | 220.373 | 54,9                                       | 60,4   |
| -Ha hecho entre 1 y 2 veces al año       | 86.367  | 21,5                                       | 23,7   |
| -Ha hecho entre 1 y 2 veces al mes       | 50.732  | 12,6                                       | 13,9   |
| -Ha hecho todas o casi todas las semanas | 4.488   | 1,1  | 1,2  |
| -NS/NC                                   | 2.689   | 0,7  | 0,7  |
| Total                                    | 401.074 | 100,0                                      | --   |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 34. Distribución de la población de 15 a 34 años en función de la frecuencia de botellón en la calle en los últimos 12 meses por sexo y grupos de edad (%). 2017**

|  | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|--|--------|-------|----------------|-------|-------|
|  | Hombre | Mujer | 15-24          | 25-34 |       |
| Nunca ha probado el alcohol              | 7,4    | 10,8  | 11,6           | 6,9   | 9,1   |
| Ha probado el alcohol:                   | 92,6   | 89,2  | 88,4           | 93,1  | 90,9  |
| -No ha hecho botellón                    | 53,2   | 56,7  | 31,7           | 74,5  | 54,9  |
| -Ha hecho entre 1 y 2 veces al año       | 23,8   | 19,2  | 30,2           | 14,2  | 21,5  |
| -Ha hecho entre 1 y 2 veces al mes       | 13,7   | 11,6  | 23,6           | 3,4   | 12,6  |
| -Ha hecho todas o casi todas las semanas | 1,5    | 0,7   | 2,2            | 0,2   | 1,1   |
| -NS/NC                                   | 0,4    | 1,0   | 0,7            | 0,7   | 0,7   |
| Total                                    | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |

Nota: las proporciones recogidas en esta tabla están calculadas sobre la población total de 15 a 34 años.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 35. Evolución de la distribución de la población de 15 a 34 años en función de la frecuencia de botellón en la calle en los últimos 12 meses (%)**

|  | 2006  | 2008  | 2010  | 2012  | 2017  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nunca ha probado el alcohol              | 3,8   | 7,6   | 13,0  | 12,8  | 9,1   |
| Ha probado el alcohol:                   | 96,2  | 92,4  | 87,0  | 87,2  | 90,9  |
| -No ha hecho botellón                    | 57,6  | 52,7  | 50,3  | 47,2  | 54,9  |
| -Ha hecho entre 1 y 2 veces al año       | 21,0  | 21,0  | 19,3  | 21,1  | 21,5  |
| -Ha hecho entre 1 y 2 veces al mes       | 11,4  | 8,1   | 10,4  | 12,3  | 12,6  |
| -Ha hecho todas o casi todas las semanas | 5,0   | 5,1   | 3,7   | 5,1   | 1,1   |
| -NS/NC                                   | 1,2   | 5,5   | 3,3   | 1,4   | 0,7   |
| Total                                    | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.



## 2. EL CONSUMO DE TABACO

### 2.1. Prevalencias generales de consumo de tabaco

**Tabla 36. Prevalencias generales de consumo de tabaco por sexo y grupos de edad. 2017 (%)**

|                         | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|-------------------------|--------|-------|----------------|-------|-------|
|                         | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Alguna vez en la vida   | 57,0   | 45,5  | 36,9           | 55,7  | 51,2  |
| En los últimos 12 meses | --     | --    | --             | --    | --    |
| En los últimos 30 días  | 28,2   | 21,1  | 24,2           | 24,8  | 24,6  |
| A diario                | 25,6   | 18,6  | 19,9           | 22,8  | 22,1  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 37. Evolución de las prevalencias generales de consumo de tabaco (%)**

|                         | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2017 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alguna vez en la vida   | 59,2 | 56,4 | 55,4 | 47,6 | 49,0 | 61,0 | 53,7 | 59,6 | 60,2 | 59,3 | 54,4 | 51,2 |
| En los últimos 12 meses | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | 38,2 | 36,1 | 31,2 | --   |
| En los últimos 30 días  | 38,8 | 38,9 | 35,2 | 34,4 | 35,0 | 36,9 | 35,0 | 35,6 | 35,2 | 33,5 | 29,3 | 24,6 |
| A diario                | --   | --   | --   | --   | 28,6 | --   | 30,3 | 30,9 | 32,6 | 31,3 | 25,5 | 22,1 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

### 2.2. Distribución de la población en relación con el tabaco

**Tabla 38. Distribución de la población en relación al consumo de tabaco. 2017 (%)**

|                          | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|--------------------------|--------|-------|----------------|-------|-------|
|                          | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Consumo habitual         | 25,6   | 18,6  | 19,9           | 22,8  | 22,1  |
| Consumo ocasional        | 2,6    | 2,6   | 4,3            | 2,0   | 2,6   |
| Ha abandonado el consumo | 28,8   | 24,3  | 12,6           | 31,0  | 26,5  |
| Nunca ha probado         | 43,0   | 54,5  | 63,1           | 44,3  | 48,8  |
| Total                    | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 39. Evolución de la distribución de la población en relación al consumo de tabaco (%)**

|                   | 1992  | 1994  | 1996  | 1998  | 2000  | 2002  | 2004  | 2006  | 2008  | 2010  | 2012  | 2017  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Consumo habitual  | 38,8  | 38,9  | 35,2  | 34,4  | 29,3  | 30,0  | 30,3  | 30,9  | 30,5  | 28,9  | 25,7  | 22,1  |
| Consumo ocasional |       |       |       |       | 5,7   | 6,9   | 4,7   | 4,6   | 5,3   | 5,2   | 5,5   | 2,6   |
| Abandono          | 20,3  | 17,4  | 20,2  | 13,3  | 14,0  | 24,2  | 18,7  | 24,0  | 24,4  | 25,2  | 23,2  | 26,5  |
| Nunca ha probado  | 40,8  | 43,6  | 44,6  | 52,4  | 51,0  | 39,0  | 46,3  | 40,4  | 39,8  | 40,7  | 45,6  | 48,8  |
| Total             | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

### 2.3. Edad de inicio en el consumo de tabaco

**Tabla 40. Distribución de la edad de inicio en el consumo de tabaco. 2017 (%)**

|                            | Número    | Distribución sobre la población total | Distribución sobre la población que ha consumido alguna vez |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------|---|
| Nunca ha probado el tabaco | 811.405   | 48,8                                  | --  |
| Ha consumido alguna vez:   | 850.819   | 51,2                                  | 100,0   |
| - Menos de 15 años         | 188.310   | 11,3                                  | 22,1  |
| - Entre 15 y 16 años       | 311.102   | 18,7                                  | 36,6  |
| - Entre 17 y 18 años       | 186.706   | 11,2                                  | 21,9  |
| - Entre 19 y 20 años       | 83.378    | 5,0                                   | 9,8   |
| - Entre 21 y 22 años       | 28.791    | 1,7                                   | 3,4   |
| - 23 o más años            | 52.532    | 3,2                                   | 6,2   |
| Total                      | 1.662.224 | 100,0                                 | --  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 41. Distribución de la edad de inicio en el consumo de tabaco entre la población que ha consumido tabaco alguna vez por sexo y edad. 2017 (%)**

|                    | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|--------------------|--------|-------|----------------|-------|-------|
|                    | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Menos de 15 años   | 25,0   | 18,6  | 22,6           | 22,0  | 22,1  |
| Entre 15 y 16 años | 34,3   | 39,3  | 45,1           | 34,8  | 36,6  |
| Entre 17 y 18 años | 20,2   | 24,2  | 24,6           | 21,4  | 21,9  |
| Entre 19 y 20 años | 9,4    | 10,3  | 4,4            | 10,9  | 9,8   |
| Entre 21 y 22 años | 3,5    | 3,3   | 1,8            | 3,7   | 3,4   |
| 23 o más años      | 7,7    | 4,3   | 1,5            | 7,2   | 6,2   |
| Total              | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |

Nota: las respuestas expuestas en esta tabla están calculadas sobre el 51,2% de la muestra, que se corresponde con la proporción de la población que ha consumido tabaco alguna vez.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 42. Edad media de inicio en el consumo de tabaco por sexo y grupos de edad. 2017 (%)**

|                   | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|-------------------|--------|-------|----------------|-------|-------|
|                   | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Media             | 16,9   | 16,8  | 15,9           | 17,0  | 16,9  |
| Mediana           | 16     | 16    | 16             | 16    | 16    |
| Desviación típica | 4,39   | 3,27  | 2,10           | 4,19  | 3,93  |

Nota: la edad de inicio se corresponde con la edad en la que se ha probado el tabaco por primera vez. Responden a esta pregunta el 51,2% de la muestra, que se corresponde con la proporción de la población que ha consumido tabaco alguna vez.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 43. Evolución de la distribución de la edad media de inicio en el consumo de tabaco entre la población que ha consumido tabaco alguna vez (%)**

|                    | 1996  | 1998  | 2000  | 2002  | 2004  | 2006  | 2008  | 2010  | 2012  | 2017  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Grupos</b>      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Menos de 15 años   | 30,5  | 28,6  | 25,0  | 24,1  | 27,2  | 26,1  | 24,6  | 23,8  | 19,2  | 22,1  |
| Entre 15 y 17 años | 35,6  | 38,8  | 41,2  | 38,6  | 37,4  | 39,1  | 39,4  | 43,8  | 46,0  | 48,0  |
| Entre 18 y 20 años | 22,4  | 22,4  | 24,1  | 23,2  | 23,4  | 24,6  | 24,7  | 22,6  | 25,1  | 20,3  |
| Con 21 o más años  | 10,2  | 10,2  | 9,7   | 14,0  | 12,0  | 10,1  | 11,4  | 9,8   | 9,7   | 9,6   |
| NS/NC              | 1,2   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Total              | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| <b>Media</b>       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Edad media         | 16,8  | 16,7  | 16,9  | 17,5  | 16,9  | 16,9  | 17,0  | 16,8  | 17,0  | 16,9  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

## 2.4. Intensidad del consumo de tabaco

**Tabla 44. Distribución del número de unidades\* de tabaco consumidas por término medio al día entre la población que ha consumido tabaco en los últimos 30 días. 2017 (%)**

|                                    | Número    | Distribución sobre la población total | Distribución sobre la población que consume tabaco actualmente |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|
| Nunca ha probado el tabaco         | 811.405   | 48,8                                  | --   |
| Ha abandonado el consumo de tabaco | 441.249   | 26,5                                  | --   |
| Consumo tabaco actualmente:        | 409.569   | 24,6                                  | 100,0  |
| -Hasta 5 unidades                  | 137.323   | 8,3                                   | 33,5   |
| -Entre 6 y 10 unidades             | 116.280   | 7,0                                   | 28,4   |
| -Entre 11 y 15 unidades            | 59.139    | 3,6                                   | 14,4   |
| -Entre 16 y 20 unidades            | 75.696    | 4,6                                   | 18,5   |
| -Más de 20 unidades                | 21.132    | 1,3                                   | 5,2  |
| Total                              | 1.662.224 | 100,0                                 | --   |

\*En unidades se incluyen diversas modalidades de tabaco: el cigarrillo de cajetilla, el cigarrillo elaborado con tabaco de liar y el puro.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 45. Distribución del número de unidades\* de tabaco consumidas por término medio al día entre la población que ha consumido tabaco en los últimos 30 días por sexo y edad. 2017 (%)**

|                        | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|------------------------|--------|-------|----------------|-------|-------|
|                        | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Hasta 5 unidades       | 34,5   | 32,2  | 44,7           | 30,1  | 33,5  |
| Entre 6 y 10 unidades  | 25,6   | 32,1  | 30,6           | 27,7  | 28,4  |
| Entre 11 y 15 unidades | 13,8   | 15,3  | 11,7           | 15,3  | 14,4  |
| Entre 16 y 20 unidades | 18,4   | 18,6  | 11,5           | 20,6  | 18,5  |
| Más de 20 unidades     | 7,8    | 1,7   | 1,5            | 6,3   | 5,2   |
| Total                  | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |

Nota: las respuestas expuestas en esta tabla están calculadas sobre el 24,6% de la muestra, que se corresponde con la proporción de la población que ha consumido tabaco en los últimos 30 días.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 46. Evolución de la distribución del número de unidades\* de tabaco consumidas por término medio al día entre la población que ha consumido tabaco en los últimos 30 días (%)**

|                        | 1992  | 1994  | 1996  | 1998  | 2000  | 2002  | 2004  | 2006  | 2008  | 2010  | 2012  | 2017 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Hasta 10 unidades      | 36,7  | 39,6  | 39,4  | 44,7  | 48,5  | 52,3  | 50,7  | 52,0  | 51,1  | 56,8  | 57,4  | 61,9 |
| Entre 11 y 20 unidades | 40,6  | 36,5  | 40,4  | 37,1  | 34,1  | 36,1  | 36,76 | 38,47 | 38,3  | 36,0  | 37,5  | 32,9 |
| Más de 20 unidades     | 19,6  | 23,9  | 20,1  | 18,2  | 17,4  | 11,6  | 12,52 | 9,523 | 9,1   | 7,2   | 5,1   | 5,2  |
| NS/NC                  | 3,1   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 1,5   | 0,0   | 0,0   | 61,9 |
| Total                  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 32,9 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

## 2.5. Tipo de tabaco consumido

**Tabla 47. Distribución del tipo de tabaco consumido entre la población que ha consumido tabaco en los últimos 30 días. 2017 (%)**

|   | Fumador/a con consumo diario | Fumador/a con consumo ocasional | Total |
|---|------------------------------|---------------------------------|-------|
| Solo cigarrillos de paquete             | 71,6                         | 75,5                            | 72,0  |
| Solo tabaco de liar                     | 13,9                         | 16,5                            | 14,2  |
| Solo puros                              | 6,6                          | 4,5                             | 6,4   |
| Cigarrillos de paquete y tabaco de liar | 6,1                          | 2,8                             | 5,8   |
| Otras combinaciones                     | 1,8                          | 0,6                             | 1,7   |
| Total                                   | 100,0                        | 100,0                           | 100,0 |

Nota: las respuestas expuestas en esta tabla están calculadas sobre el 24,6% de la muestra, que se corresponde con la proporción de la población que ha consumido tabaco en los últimos 30 días.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 48. Distribución del tipo de tabaco consumido entre la población que ha consumido tabaco en los últimos 30 días por sexo y grupos de edad. 2017 (%)**

|   | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|---|--------|-------|----------------|-------|-------|
|   | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Solo cigarrillos de paquete             | 64,4   | 81,9  | 64,7           | 74,3  | 72,0  |
| Solo tabaco de liar                     | 13,7   | 14,7  | 25,1           | 10,8  | 14,2  |
| Solo puros                              | 10,8   | 0,6   | 0,7            | 8,2   | 6,4   |
| Cigarrillos de paquete y tabaco de liar | 8,1    | 2,7   | 7,8            | 5,1   | 5,8   |
| Otras combinaciones                     | 3,0    | 0,0   | 1,8            | 1,6   | 1,7   |
| Total                                   | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |

Nota: las respuestas expuestas en esta tabla están calculadas sobre el 24,6% de la muestra, que se corresponde con la proporción de la población que ha consumido tabaco en los últimos 30 días.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

## 2.6. Disposición e intención de abandono del consumo de tabaco

**Tabla 49. Distribución de la población que consume tabaco a diario en función de su disposición e intento de abandono en los últimos 12 meses (%)**

|   | Número    | Distribución entre la población total | Distribución entre la población que consume tabaco a diario |
|---|-----------|---------------------------------------|---|
| Nunca ha probado el tabaco                                  | 811.405   | 48,8                                  | --  |
| Ha abandonado el consumo de tabaco                          | 441.249   | 26,5                                  | --  |
| Consume tabaco ocasionalmente                               | 42.518    | 2,6                                   | --  |
| Consume tabaco a diario:                                    | 367.051   | 22,1                                  | 100,0   |
| – <i>Le gustaría dejar de fumar y lo ha intentado</i>       | 98.906    | 6,0                                   | 26,9  |
| – <i>Le gustaría dejar de fumar pero no lo ha intentado</i> | 186.883   | 11,2                                  | 50,9  |
| – <i>No le gustaría dejar de fumar pero lo ha intentado</i> | 3.945     | 0,2                                   | 1,1   |
| – <i>No le gustaría dejar de fumar y no lo ha intentado</i> | 77.316    | 4,7                                   | 21,1  |
| Total   | 1.662.224 | 100,0                                 | --  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

**Tabla 50. Distribución de la población que consume tabaco a diario en función de su disposición e intento de abandono en los últimos 12 meses por sexo y grupos de edad (% verticales)**

|  | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|--|--------|-------|----------------|-------|-------|
|  | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Le gustaría dejar de fumar y lo ha intentado       | 25,3   | 29,2  | 22,1           | 28,3  | 26,9  |
| Le gustaría dejar de fumar pero no lo ha intentado | 54,7   | 45,8  | 52,5           | 50,5  | 50,9  |
| No le gustaría dejar de fumar pero lo ha intentado | 0,4    | 1,9   | 1,9            | 0,8   | 1,1   |
| No le gustaría dejar de fumar y no lo ha intentado | 19,6   | 23,1  | 23,5           | 20,4  | 21,1  |
| Total  | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |

\*Las respuestas expuestas en esta tabla están calculadas sobre el 22,1% de la muestra, que se corresponde con la proporción de la población que consume tabaco a diario.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

## 2.7. Causas del abandono o disminución del consumo de tabaco

**Tabla 51. Grado de influencia de diversas causas en el abandono del hábito tabáquico diario\*. 2017 (%)**

|   | Nada | Poco | Bastante | Mucho | Total |
|---|------|------|----------|-------|-------|
| Recomendación del médico                    | 66,0 | 6,9  | 14,5     | 12,6  | 100,0 |
| Presión de la familia o de la pareja        | 71,9 | 12,6 | 10,8     | 4,6   | 100,0 |
| Por miedo al cáncer u otras enfermedades    | 54,1 | 11,6 | 20,3     | 14,0  | 100,0 |
| Embarazo                                    | 83,7 | 2,6  | 2,5      | 11,2  | 100,0 |
| Crianza de los hijos e hijas                | 77,5 | 4,3  | 8,9      | 9,3   | 100,0 |
| Tuve un problema de salud concreto          | 68,3 | 5,2  | 11,9     | 14,6  | 100,0 |
| Por la imposibilidad de fumar en el trabajo | 88,3 | 7,3  | 3,7      | 0,7   | 100,0 |
| Porque me impedía hacer deporte             | 79,7 | 9,0  | 8,3      | 3,0   | 100,0 |
| Por cambios en la normativa de tabaco       | 85,9 | 6,5  | 5,2      | 2,4   | 100,0 |
| Por motivos económicos                      | 80,6 | 8,4  | 8,3      | 2,7   | 100,0 |

\*Las respuestas expuestas en esta tabla están calculadas sobre el 26,9% de la muestra. Recogen las declaraciones de aquellas personas que se encuentran en alguna de las siguientes tres situaciones: consumo diario de tabaco e intento de abandono en los últimos 12 meses (6,2%); sin consumo actual de tabaco pero con consumo diario en el pasado (19,1%); y consumo ocasional de tabaco y consumo diario en el pasado (1,6%).

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 52. Grado de influencia de diversas causas en el abandono del hábito tabáquico diario\* por sexo y grupos de edad. 2017**  
(% de quienes responden que dichas causas han tenido bastante o mucho que ver)

|   | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|---|--------|-------|----------------|-------|-------|
|   | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Recomendación del médico                    | 32,3   | 20,8  | 17,6           | 28,3  | 27,1  |
| Presión de la familia o de la pareja        | 15,8   | 15,1  | 15,7           | 15,4  | 15,5  |
| Por miedo al cáncer u otras enfermedades    | 35,9   | 32,4  | 44,4           | 32,9  | 34,3  |
| Embarazo                                    | 4,7    | 24,3  | 12,3           | 13,8  | 13,7  |
| Crianza de los hijos e hijas                | 15,4   | 21,6  | 13,2           | 18,9  | 18,2  |
| Tuve un problema de salud concreto          | 28,7   | 24,0  | 24,4           | 26,8  | 26,5  |
| Por la imposibilidad de fumar en el trabajo | 2,0    | 7,2   | 4,4            | 4,4   | 4,4   |
| Porque me impedía hacer deporte             | 13,3   | 9,0   | 16,0           | 10,7  | 11,3  |
| Por cambios en la normativa de tabaco       | 5,7    | 9,8   | 6,8            | 7,7   | 7,6   |
| Por motivos económicos                      | 9,4    | 13,0  | 20,9           | 9,7   | 11,0  |

\*Las respuestas expuestas en esta tabla están calculadas sobre el 26,9% de la muestra. Recogen las declaraciones de aquellas personas que se encuentran en alguna de las siguientes tres situaciones: consumo diario de tabaco e intento de abandono en los últimos 12 meses (6,2%); sin consumo actual de tabaco pero con consumo diario en el pasado (19,1%); y consumo ocasional de tabaco y consumo diario en el pasado (1,6%).

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 53. Evolución del grado de influencia de diversas causas en el abandono del hábito tabáquico**  
(% de quienes responden que dichas causas han tenido bastante o mucho que ver)

|   | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2017 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Recomendación del médico                    | 17,5 | 19,1 | 18,1 | 21,5 | 26,1 | 27,1 |
| Presión de la familia o de la pareja        | 9,7  | 14,4 | 11,2 | 19,2 | 26,1 | 15,5 |
| Por miedo al cáncer u otras enfermedades    | 21,2 | 24,0 | 29,1 | 33,6 | 32,9 | 34,3 |
| Embarazo                                    | 13,9 | 11,9 | 13,3 | 10,6 | 13,7 | 13,7 |
| Tuve un problema de salud concreto          | 18,4 | 17,1 | 19,3 | 16,9 | 18,5 | 26,5 |
| Por la imposibilidad de fumar en el trabajo | 1,9  | 2,7  | 2,0  | 3,4  | 3,0  | 4,4  |
| Porque me impedía hacer deporte             | 8,2  | 6,8  | 7,8  | 5,0  | 5,5  | 11,3 |
| Por cambios en la normativa de tabaco       | --   | 2,6  | 1,6  | 1,5  | 3,3  | 7,6  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

## 2.8. Consumo de cigarrillos electrónicos

**Tabla 54. Prevalencia de consumo alguna vez en la vida de cigarrillos electrónicos\*. 2017 (%)**

|       | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|-------|--------|-------|----------------|-------|-------|
|       | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Sí    | 6,9    | 5,1   | 9,3            | 5,0   | 6,0   |
| No    | 93,1   | 94,9  | 90,7           | 95,0  | 94,0  |
| Total | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |

\*¿Alguna vez en su vida ha fumado cigarrillos electrónicos (vapear)? No considere que lo ha hecho si lo único que hizo fue dar unas caladas al cigarrillo electrónico de otra persona.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

## 2.9. Exposición al humo del tabaco

**Tabla 55. Exposición al humo del tabaco entre la población en función del consumo actual de tabaco. 2017 (%)**

|   | Personas que han consumido en los últimos 30 días | Personas que no han consumido en los últimos 30 días | Población total |
|---|---|--|-----------------|
| <b>En su casa</b>                       |   |  |                 |
| Todos los días                          | 15,1  | 3,1  | 6,1             |
| Con mucha frecuencia                    | 4,2   | 2,6  | 3,0             |
| De vez en cuando                        | 7,9   | 4,6  | 5,4             |
| Raras veces                             | 6,5   | 6,2  | 6,3             |
| Nunca                                   | 66,2  | 83,5   | 79,3            |
| Total                                   | 100,0   | 100,0  | 100,0           |
| <b>En su lugar de trabajo o estudio</b> |   |  |                 |
| Todos los días                          | 5,5   | 1,9  | 2,8             |
| Con mucha frecuencia                    | 3,7   | 2,7  | 2,9             |
| De vez en cuando                        | 3,9   | 3,8  | 3,8             |
| Raras veces                             | 4,1   | 3,4  | 3,6             |
| Nunca                                   | 82,9  | 88,2   | 86,9            |
| Total                                   | 100,0   | 100,0  | 100,0           |
| <b>En el coche</b>                      |   |  |                 |
| Todos los días                          | 4,0   | 0,4  | 1,3             |
| Con mucha frecuencia                    | 4,1   | 2,0  | 2,5             |
| De vez en cuando                        | 9,1   | 2,7  | 4,2             |
| Raras veces                             | 6,9   | 4,7  | 5,3             |
| Nunca                                   | 75,9  | 90,2   | 86,7            |
| Total                                   | 100,0   | 100,0  | 100,0           |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

**Tabla 56. Prevalencia de la exposición al humo de tabaco entre la población en función del consumo actual de tabaco, por sexo y grupos de edad. 2017 (% de personas expuestas con mucha frecuencia o todos los días)**

|  | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|--|--------|-------|----------------|-------|-------|
|  | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| <b>Personas con consumo actual de tabaco</b> |        |       |                |       |       |
| En su casa                                   | 16,9   | 22,5  | 25,7           | 17,3  | 19,3  |
| En su lugar de trabajo                       | 9,4    | 9,0   | 17,1           | 6,8   | 9,2   |
| En el coche                                  | 8,8    | 7,2   | 12,3           | 6,8   | 8,1   |
| <b>Personas sin consumo actual de tabaco</b> |        |       |                |       |       |
| En su casa                                   | 3,9    | 7,3   | 9,4            | 4,5   | 5,7   |
| En su lugar de trabajo                       | 4,9    | 4,2   | 6,9            | 3,8   | 4,5   |
| En el coche                                  | 2,2    | 2,5   | 3,4            | 2,0   | 2,4   |
| <b>Población total</b>                       |        |       |                |       |       |
| En su casa                                   | 7,6    | 10,5  | 13,3           | 7,7   | 9,0   |
| En su lugar de trabajo                       | 6,2    | 5,2   | 9,4            | 4,5   | 5,7   |
| En el coche                                  | 4,1    | 3,5   | 5,6            | 3,2   | 3,8   |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

### 3. EL CONSUMO DE CANNABIS

#### 3.1. Prevalencias generales de consumo de cannabis

**Tabla 57. Prevalencias generales de consumo de cannabis por sexo y grupos de edad. 2017 (%)**

|                         | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|-------------------------|--------|-------|----------------|-------|-------|
|                         | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Alguna vez en la vida   | 47,6   | 30,6  | 53,9           | 34,3  | 39,0  |
| En los últimos 12 meses | 11,7   | 5,4   | 21,1           | 4,6   | 8,6   |
| En los últimos 30 días  | 7,4    | 2,4   | 11,9           | 2,6   | 4,9   |
| A diario                | 3,3    | 0,7   | 3,7            | 1,4   | 2,0   |

Nota: se considera consumo diario el consumo realizado con una frecuencia de al menos cuatro días a la semana en los últimos 30 días.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 58. Evolución de las prevalencias generales de consumo de cannabis (%)**

|                         | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2017 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alguna vez en la vida   | 22,9 | 22,6 | 28,6 | 24,4 | 26,8 | 27,6 | 31,7 | 36,2 | 33,8 | 34,2 | 28,3 | 39,0 |
| En los últimos 12 meses | 6,5  | 5,5  | 4,9  |      | 8,4  | 12,2 | 12,0 | 14,0 | 12,0 | 10,4 | 6,3  | 8,6  |
| En los últimos 30 días  | 3,2  | 3,4  | 3,8  | 4,4  | 5,5  | 8,9  | 9,0  | 11,0 | 8,7  | 7,2  | 4,3  | 4,9  |
| A diario                | 0,5  | 0,9  | 1,9  | 1,3  | 1,5  | 1,9  | 4,1  | 3,8  | 3,9  | 2,5  | 1,7  | 2,0  |

Nota: se considera consumo diario el consumo realizado con una frecuencia de al menos cuatro días a la semana en los últimos 30 días.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

#### 3.2. Edad de inicio en el consumo de cannabis

**Tabla 59. Edad de inicio en el consumo de cannabis por sexo y grupos de edad. 2017 (%)**

|                   | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|-------------------|--------|-------|----------------|-------|-------|
|                   | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Media             | 18,4   | 18,9  | 17,1           | 19,4  | 18,6  |
| Mediana           | 18,0   | 18,0  | 17,0           | 18,0  | 18,0  |
| Desviación típica | 3,64   | 4,83  | 2,43           | 4,61  | 4,15  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 60. Evolución de la edad media de inicio en el consumo de cannabis**

|                      | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2017 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Edad media de inicio | --   | 18,8 | --   | --   | 19,1 | 18,8 | 18,0 | 18,4 | 19,2 | 18,8 | 18,6 | 18,6 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.



### 3.3. Frecuencia de consumo de cannabis

**Tabla 61. Frecuencia de consumo de cannabis entre la población total. 2017 (%)**

|  | Distribución entre la población total | Distribución de la población que ha consumido en cada periodo |
|--|---------------------------------------|---|
| <b>Consumo durante los últimos 12 meses</b>            |                                       |   |
| Nunca ha probado el cannabis                           | 61,0                                  | --  |
| Ha probado pero no ha consumido en el último año       | 30,5                                  | --  |
| Ha consumido en el último año                          | 8,6                                   | 100,0   |
| -1-5 días al año                                       | 3,4                                   | 39,9  |
| -6-11 días al año                                      | 0,8                                   | 9,1   |
| -1-3 días al mes                                       | 1,2                                   | 13,8  |
| -1-3 días a la semana                                  | 1,1                                   | 12,3  |
| -4-6 días a la semana                                  | 0,5                                   | 6,3   |
| -A diario  | 1,6                                   | 18,5  |
| Total  | 100,0                                 |   |
| <b>Consumo durante los últimos 30 días</b>             |                                       |   |
| Nunca ha probado el cannabis                           | 61,0                                  | --  |
| Ha probado pero no ha consumido en el último año       | 30,5                                  | --  |
| Ha consumido en el último año pero no en el último mes | 3,7                                   | --  |
| Ha consumido en el último mes                          | 4,9                                   | 100,0   |
| -1-3 días al mes                                       | 1,9                                   | 38,3  |
| -1-3 días a la semana                                  | 1,0                                   | 21,5  |
| -4-6 días a la semana                                  | 0,5                                   | 10,4  |
| -A diario  | 1,4                                   | 29,8  |
| Total  | 100,0                                 |   |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

**Tabla 62. Frecuencia de consumo de cannabis entre la población total por sexo y grupos de edad. 2017 (%)**

|   | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|---|--------|-------|----------------|-------|-------|
|   | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| <b>Consumo durante los últimos 12 meses</b>             |        |       |                |       |       |
| No ha probado o no ha consumido en los últimos 12 meses | 88,3   | 94,6  | 78,9           | 95,4  | 91,4  |
| Ha consumido en el último año:                          | 11,7   | 5,4   | 21,1           | 4,6   | 8,6   |
| -Entre 1 y 11 días al año                               | 5,1    | 3,3   | 11,3           | 2,0   | 4,2   |
| -Entre 1 y 3 días al mes                                | 1,6    | 0,8   | 3,3            | 0,5   | 1,2   |
| -Entre 1 y 3 días a la semana                           | 1,8    | 0,3   | 2,3            | 0,7   | 1,1   |
| -Entre 4 y 7 días a la semana                           | 3,3    | 1,0   | 4,3            | 1,4   | 2,1   |
| Total   | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |
| <b>Consumo durante los últimos 30 días</b>              |        |       |                |       |       |
| No ha probado o no ha consumido en el último mes        | 92,6   | 97,6  | 88,1           | 97,4  | 95,1  |
| Ha consumido en el último mes:                          | 7,4    | 2,4   | 11,9           | 2,6   | 4,9   |
| -Entre 1 y 3 días al mes                                | 2,4    | 1,3   | 5,4            | 0,7   | 1,9   |
| -Entre 1 y 3 días a la semana                           | 1,7    | 0,4   | 2,7            | 0,5   | 1,0   |
| -Entre 4 y 7 días a la semana                           | 3,3    | 0,7   | 3,7            | 1,4   | 2,0   |
| Total   | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

### 3.4. Vía de obtención del cannabis

**Tabla 63. Vías de obtención del cannabis entre las personas que lo han consumido en los últimos 12 meses. 2017 (%)**

|   | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|---|--------|-------|----------------|-------|-------|
|   | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Me la ofreció un amigo/a o conocido/a         | 4,5    | 2,3   | 4,2            | 2,6   | 6,8   |
| Fui a una tienda especializada y la compré    | 0,4    | 0,0   | 0,3            | 0,1   | 0,4   |
| La compré a través de un/a vendedor/a         | 1,6    | 0,4   | 1,1            | 0,9   | 2,0   |
| La compré a través de internet                | 0,0    | 0,0   | 0,0            | 0,0   | 0,0   |
| Lo conseguí a través de una plantación propia | 0,6    | 0,1   | 0,5            | 0,3   | 0,8   |
| Lo conseguí a través de un club de cannabis   | 0,1    | 0,1   | 0,2            | 0,1   | 0,2   |
| Otras vías de acceso                          | 0,1    | 0,0   | 0,1            | 0,0   | 0,1   |
| No contesta                                   | 0,0    | 0,1   | 0,0            | 0,1   | 0,1   |

Nota: los porcentajes están calculados sobre el 8,6% de la muestra que afirma haber consumido cannabis en los últimos 12 meses. Se trata de una pregunta multirespuesta.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

#### 4. CONSUMO DE OTRAS SUSTANCIAS ILEGALES

##### 4.1. Prevalencias generales de consumo de otras sustancias ilegales<sup>1</sup>

Tabla 64. Prevalencias generales de consumo de otras sustancias ilegales. 2017 (%)

|                           | Alguna vez en la vida | En los últimos 12 meses | En los últimos 30 días |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Speed, anfetaminas        | 8,5                   | 1,0                     | 0,4                    |
| MDMA y similares, éxtasis | 3,6                   | 0,4                     | 0,1                    |
| Ácido, LSD                | 3,2                   | 0,1                     | 0,0                    |
| Cocaína en polvo          | 9,0                   | 1,4                     | 0,4                    |
| Base, crack               | 0,4                   | 0,0                     | 0,0                    |
| Heroína                   | 0,6                   | 0,0                     | 0,0                    |
| Otros opiáceos            | 0,5                   | 0,1                     | 0,1                    |
| Inhalables                | 0,4                   | 0,0                     | 0,0                    |
| Setas alucinógenas        | 3,5                   | 0,1                     | 0,0                    |
| Ketamina                  | 0,6                   | 0,0                     | 0,0                    |
| Otras                     | 0,0                   | 0,0                     | 0,0                    |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 65. Prevalencia de consumo alguna vez en la vida de otras sustancias ilegales por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

|                           | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|---------------------------|--------|-------|----------------|-------|-------|
|                           | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Speed, anfetaminas        | 12,4   | 4,6   | 9,4            | 8,2   | 8,5   |
| MDMA y similares, éxtasis | 5,9    | 1,4   | 5,1            | 3,2   | 3,6   |
| Ácido, LSD                | 4,9    | 1,6   | 1,8            | 3,7   | 3,2   |
| Cocaína en polvo          | 13,3   | 4,8   | 9,6            | 8,9   | 9,0   |
| Base, crack               | 0,6    | 0,2   | 0,3            | 0,5   | 0,4   |
| Heroína                   | 0,8    | 0,5   | 0,1            | 0,8   | 0,6   |
| Otros opiáceos            | 0,5    | 0,4   | 0,0            | 0,6   | 0,5   |
| Inhalables                | 0,6    | 0,2   | 0,2            | 0,5   | 0,4   |
| Setas alucinógenas        | 4,9    | 2,1   | 5,2            | 2,9   | 3,5   |
| Ketamina                  | 1,0    | 0,2   | 1,9            | 0,2   | 0,6   |
| Otras                     | 0,0    | 0,0   | 0,0            | 0,0   | 0,0   |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

<sup>1</sup> Los datos que se muestran en este apartado hacen referencia a la proporción de personas que han consumido en distintos periodos (alguna vez, en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días) cada una de las sustancias que se mencionan. Dado que una persona puede haber consumido más de una sustancia, los resultados que aparecen en cada columna no pueden ser sumados.

**Tabla 66. Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses de otras sustancias ilegales por sexo y grupos de edad. 2017 (%)**

|                           | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|---------------------------|--------|-------|----------------|-------|-------|
|                           | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Speed, anfetaminas        | 1,4    | 0,6   | 1,6            | 0,8   | 1,0   |
| MDMA y similares, éxtasis | 0,6    | 0,3   | 0,9            | 0,3   | 0,4   |
| Ácido, LSD                | 0,2    | 0,0   | 0,1            | 0,1   | 0,1   |
| Cocaína en polvo          | 2,4    | 0,3   | 2,7            | 0,9   | 1,4   |
| Base, crack               | 0,0    | 0,0   | 0,0            | 0,0   | 0,0   |
| Heroína                   | 0,0    | 0,0   | 0,0            | 0,0   | 0,0   |
| Otros opiáceos            | 0,2    | 0,0   | 0,0            | 0,1   | 0,1   |
| Inhalables                | 0,0    | 0,0   | 0,0            | 0,0   | 0,0   |
| Setas alucinógenas        | 0,1    | 0,0   | 0,3            | 0,0   | 0,1   |
| Ketamina                  | 0,1    | 0,0   | 0,2            | 0,0   | 0,0   |
| Otras                     | 0,0    | 0,0   | 0,0            | 0,0   | 0,0   |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 67. Prevalencia de consumo en los últimos 30 días de otras sustancias ilegales por sexo y grupos de edad. 2017 (%)**

|                           | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|---------------------------|--------|-------|----------------|-------|-------|
|                           | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Speed, anfetaminas        | 0,4    | 0,4   | 0,9            | 0,2   | 0,4   |
| MDMA y similares, éxtasis | 0,3    | 0,0   | 0,5            | 0,0   | 0,1   |
| Ácido, LSD                | 0,1    | 0,0   | 0,1            | 0,0   | 0,0   |
| Cocaína en polvo          | 0,8    | 0,1   | 1,2            | 0,2   | 0,4   |
| Base, crack               | 0,0    | 0,0   | 0,0            | 0,0   | 0,0   |
| Heroína                   | 0,0    | 0,0   | 0,0            | 0,0   | 0,0   |
| Otros opiáceos            | 0,2    | 0,0   | 0,0            | 0,1   | 0,1   |
| Inhalables                | 0,0    | 0,0   | 0,0            | 0,0   | 0,0   |
| Setas alucinógenas        | 0,1    | 0,0   | 0,2            | 0,0   | 0,0   |
| Ketamina                  | 0,0    | 0,0   | 0,0            | 0,0   | 0,0   |
| Otras                     | 0,0    | 0,0   | 0,0            | 0,0   | 0,0   |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

## 4.2. Edad de inicio en el consumo de otras sustancias ilegales

Tabla 68. Edad media del primer consumo de otras sustancias ilegales por sexo y grupos de edad. 2017

|  | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|--|--------|-------|----------------|-------|-------|
|  | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| <b>Speed, anfetaminas</b>              |        |       |                |       |       |
| Porcentaje que ha consumido alguna vez | 12,4   | 4,6   | 9,4            | 8,2   | 8,5   |
| Edad media                             | 21,2   | 19,1  | 19,1           | 21,2  | 20,6  |
| Edad mediana                           | 20,0   | 18,0  | 19,0           | 20,0  | 20,0  |
| <b>MDMA y similares, éxtasis</b>       |        |       |                |       |       |
| Porcentaje que ha consumido alguna vez | 5,9    | 1,4   | 5,1            | 3,2   | 3,6   |
| Edad media                             | 21,1   | 22,1  | 20,2           | 21,9  | 21,3  |
| Edad mediana                           | 20,0   | 23,0  | 20,0           | 20,0  | 20,0  |
| <b>Ácido, LSD</b>                      |        |       |                |       |       |
| Porcentaje que ha consumido alguna vez | 4,9    | 1,6   | 1,8            | 3,7   | 3,2   |
| Edad media                             | 20,3   | 18,5  | 18,9           | 20,0  | 19,9  |
| Edad mediana                           | 20,0   | 18,0  | 19,0           | 19,0  | 19,0  |
| <b>Cocaína en polvo</b>                |        |       |                |       |       |
| Porcentaje que ha consumido alguna vez | 13,3   | 4,8   | 9,6            | 8,9   | 9,0   |
| Edad media                             | 22,8   | 20,9  | 19,7           | 23,2  | 22,3  |
| Edad mediana                           | 21,0   | 20,0  | 19,0           | 22,0  | 20,0  |
| <b>Base, crack</b>                     |        |       |                |       |       |
| Porcentaje que ha consumido alguna vez | 0,6    | 0,2   | 0,3            | 0,5   | 0,4   |
| Edad media                             | 25,1   | 28,5  | 23,0           | 26,6  | 26,0  |
| Edad mediana                           | 23,0   | 30,0  | 23,0           | 28,0  | 27,0  |
| <b>Heroína</b>                         |        |       |                |       |       |
| Porcentaje que ha consumido alguna vez | 0,8    | 0,5   | 0,1            | 0,8   | 0,6   |
| Edad media                             | 26,2   | 20,0  | 26,0           | 24,0  | 24,0  |
| Edad mediana                           | 27,0   | 18,0  | 26,0           | 27,0  | 26,0  |
| <b>Otros opiáceos</b>                  |        |       |                |       |       |
| Porcentaje que ha consumido alguna vez | 0,5    | 0,4   | 0,0            | 0,6   | 0,5   |
| Edad media                             | 29,0   | 39,0  |                | 33,3  | 33,3  |
| Edad mediana                           | 24,0   | 35,0  |                | 28,0  | 28,0  |
| <b>Inhalables</b>                      |        |       |                |       |       |
| Porcentaje que ha consumido alguna vez | 0,6    | 0,2   | 0,2            | 0,5   | 0,4   |
| Edad media                             | 19,1   | 23,7  | 15,0           | 20,9  | 20,4  |
| Edad mediana                           | 20,0   | 16,0  | 15,0           | 20,0  | 20,0  |
| <b>Setas alucinógenas</b>              |        |       |                |       |       |
| Porcentaje que ha consumido alguna vez | 4,9    | 2,1   | 5,2            | 2,9   | 3,5   |
| Edad media                             | 21,7   | 22,2  | 20,3           | 22,7  | 21,8  |
| Edad mediana                           | 20,0   | 20,0  | 19,0           | 22,0  | 20,0  |
| <b>Ketamina</b>                        | 21,7   | 22,2  | 20,3           | 22,7  | 21,8  |
| Porcentaje que ha consumido alguna vez | 1,0    | 0,2   | 1,9            | 0,2   | 0,6   |
| Edad media                             | 22,4   | 23,3  | 20,0           | 31,4  | 22,6  |
| Edad mediana                           | 20,0   | 23,0  | 19,0           | 36,0  | 20,0  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

### 4.3. Consumo de sustancias vía inyectada

**Tabla 69. Consumo de sustancias ilegales vía inyectada por sexo y grupos de edad. 2017**

|                       | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|-----------------------|--------|-------|----------------|-------|-------|
|                       | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Alguna vez en la vida | 1,0    | 0,4   | 0,3            | 0,9   | 0,7   |
| Últimos 12 meses      | 0,0    | 0,0   | 0,0            | 0,0   | 0,0   |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

## 5. CONSUMO DE PSICOFÁRMACOS

### 5.1. Prevalencias generales de consumo de psicofármacos

**Tabla 70. Prevalencias generales de consumo de psicofármacos con y sin receta médica. 2017 (%)**

|   | Alguna vez en la vida | En los últimos 12 meses | En los últimos 30 días |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Tranquilizantes, sedantes o somníferos</b> |                       |                         |                        |
| Con receta médica                             | 26,0                  | 13,7                    | 9,4                    |
| Sin receta médica                             | 2,3                   | 0,9                     | 0,4                    |
| <b>Antidepresivos</b>                         |                       |                         |                        |
| Con receta médica                             | 9,7                   | 5,2                     | 3,9                    |
| Sin receta médica                             | 0,2                   | 0,1                     | 0,0                    |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 71. Prevalencias generales de consumo de psicofármacos con y sin receta médica por sexo y grupos de edad. 2017**

|   | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|---|--------|-------|----------------|-------|-------|
|   | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| <b>Tranquilizantes, sedantes o somníferos con receta médica</b> |        |       |                |       |       |
| Alguna vez en la vida   | 19,6   | 32,3  | 11,5           | 30,6  | 26,0  |
| En los últimos 12 meses   | 10,6   | 16,7  | 5,1            | 16,4  | 13,7  |
| En los últimos 30 días  | 7,8    | 10,9  | 2,1            | 11,7  | 9,4   |
| <b>Tranquilizantes, sedantes o somníferos sin receta médica</b> |        |       |                |       |       |
| Alguna vez en la vida   | 1,3    | 3,2   | 2,6            | 2,2   | 2,3   |
| En los últimos 12 meses   | 0,4    | 1,5   | 0,9            | 1,0   | 0,9   |
| En los últimos 30 días  | 0,0    | 0,7   | 0,3            | 0,4   | 0,4   |
| <b>Antidepresivos con receta médica</b>                         |        |       |                |       |       |
| Alguna vez en la vida   | 5,7    | 13,7  | 4,2            | 11,5  | 9,7   |
| En los últimos 12 meses   | 3,2    | 7,2   | 1,4            | 6,4   | 5,2   |
| En los últimos 30 días  | 2,4    | 5,4   | 0,6            | 5,0   | 3,9   |
| <b>Antidepresivos sin receta médica</b>                         |        |       |                |       |       |
| Alguna vez en la vida   | 0,2    | 0,2   | 0,1            | 0,2   | 0,2   |
| En los últimos 12 meses   | 0,0    | 0,1   | 0,1            | 0,0   | 0,1   |
| En los últimos 30 días  | 0,0    | 0,0   | 0,0            | 0,0   | 0,0   |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

## 5.2. Edad del primer consumo de psicofármacos

Tabla 72. Edad media del primer consumo de psicofármacos por sexo y grupos de edad. 2017

|   | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|---|--------|-------|----------------|-------|-------|
|   | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| <b>Tranquilizantes, sedantes o somníferos con receta médica</b> |        |       |                |       |       |
| Porcentaje que ha consumido alguna vez                          | 19,6   | 32,3  | 11,5           | 30,6  | 26,0  |
| Edad media  | 38,9   | 41,2  | 21,9           | 42,5  | 40,3  |
| Edad mediana  | 40,0   | 40,0  | 22,0           | 41,0  | 40,0  |
| Desviación típica   | 13,6   | 14,3  | 5,4            | 13,2  | 14,1  |
| <b>Tranquilizantes, sedantes o somníferos sin receta médica</b> |        |       |                |       |       |
| Porcentaje que ha consumido alguna vez                          | 1,3    | 3,2   | 2,6            | 2,2   | 2,3   |
| Edad media  | 39,8   | 40,5  | 22,2           | 42,4  | 40,3  |
| Edad mediana  | 41,0   | 40,0  | 23,0           | 42,0  | 40,0  |
| Desviación típica   | 12,3   | 13,4  | 5,1            | 12,1  | 13,1  |
| <b>Antidepresivos con receta médica</b>                         |        |       |                |       |       |
| Porcentaje que ha consumido alguna vez                          | 5,7    | 13,7  | 4,2            | 11,5  | 9,7   |
| Edad media  | 31,4   | 35,6  | 23,7           | 38,4  | 34,4  |
| Edad mediana  | 29,0   | 33,0  | 23,0           | 39,0  | 31,0  |
| Desviación típica   | 12,6   | 12,7  | 5,3            | 12,5  | 12,8  |
| <b>Antidepresivos sin receta médica</b>                         |        |       |                |       |       |
| Porcentaje que ha consumido alguna vez                          | 0,2    | 0,2   | 0,1            | 0,2   | 0,2   |
| Edad media  | 37,0   | 42,6  | 19,0           | 42,1  | 39,5  |
| Edad mediana  | 37,0   | 37,0  | 19,0           | 37,0  | 37,0  |
| Desviación típica   | 0,0    | 16,8  | 0,0            | 9,5   | 11,6  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.



## 6. CONSUMO DE SUSTANCIAS DOPANTES

### 6.1. Prevalencias generales de consumo de sustancias dopantes

**Tabla 73. Prevalencias generales de consumo de sustancias dopantes por sexo y grupos de edad. 2017 (%)**

|                         | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|-------------------------|--------|-------|----------------|-------|-------|
|                         | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Alguna vez en la vida   | 4,1    | 1,5   | 3,5            | 2,6   | 2,8   |
| En los últimos 12 meses | 1,2    | 0,4   | 1,5            | 0,6   | 0,8   |
| En los últimos 30 días  | 0,8    | 0,4   | 1,1            | 0,4   | 0,6   |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 74. Evolución de las prevalencias generales de consumo de sustancias dopantes. 2017 (%)**

|                         | 2012 | 2017 |
|-------------------------|------|------|
| Alguna vez en la vida   | 0,79 | 2,8  |
| En los últimos 12 meses | 0,18 | 0,8  |
| En los últimos 30 días  | 0,14 | 0,6  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

### 6.2. Edad de inicio del primer consumo de sustancias dopantes

**Tabla 75. Edad media del primer consumo de sustancias dopantes por sexo y grupos de edad. 2017**

|  | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|--|--------|-------|----------------|-------|-------|
|  | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Porcentaje que ha consumido alguna vez | 4,1    | 1,5   | 3,5            | 2,6   | 2,8   |
| Edad media                             | 20,1   | 18,8  | 18,2           | 20,4  | 19,7  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

## 7. JUEGO

### 7.1. Frecuencia de la práctica de distintos tipos de juego

**Tabla 76. Frecuencia de la práctica de distintos tipos de juego en los últimos 12 meses. 2017 (%)**

|   | Ninguna vez | Menos de una vez por semana | Una vez por semana o más | NS/NC | Total |
|---|-------------|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|
| Lotería, quinielas, primitiva, bono-loto  | 31,1        | 44,4                        | 24,3                     | 0,2   | 100,0 |
| Juegos de cartas                          | 97,0        | 1,9                         | 1,1                      | 0,1   | 100,0 |
| Apuestas deportivas (no incluye quiniela) | 92,6        | 5,6                         | 1,7                      | 0,1   | 100,0 |
| Máquinas tragaperras                      | 97,2        | 2,1                         | 0,6                      | 0,1   | 100,0 |
| Juegos de casino (ruleta, Black Jack...)  | 98,8        | 1,1                         | 0,1                      | 0,1   | 100,0 |
| Bingo                                     | 98,7        | 1,1                         | 0,1                      | 0,2   | 100,0 |
| Otros                                     | 99,8        | 0,1                         | 0,1                      | 0,1   | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 77. Frecuencia de la práctica de distintos tipos de juego en los últimos 12 meses por sexo y edad. 2017 (%)**

|   | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|---|--------|-------|----------------|-------|-------|
|   | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| <b>Han jugado en los últimos 12 meses</b>                                     |        |       |                |       |       |
| Lotería, quinielas, primitiva, bono-loto                                      | 68,1   | 69,3  | 41,2           | 77,5  | 68,7  |
| Juegos de cartas  | 4,1    | 1,7   | 4,1            | 2,5   | 2,9   |
| Apuestas deportivas (no incluye quiniela)                                     | 13,8   | 0,9   | 16,4           | 4,4   | 7,3   |
| Máquinas tragaperras  | 4,8    | 0,7   | 4,9            | 2,0   | 2,7   |
| Juegos de casino (ruleta, Black Jack...)                                      | 2,0    | 0,3   | 4,3            | 0,2   | 1,2   |
| Bingo   | 1,0    | 1,3   | 2,6            | 0,7   | 1,1   |
| Otros   | 0,3    | 0,0   | 0,4            | 0,1   | 0,2   |
| <b>Han jugado en los últimos 12 meses con una frecuencia al menos semanal</b> |        |       |                |       |       |
| Lotería, quinielas, primitiva, bono-loto                                      | 28,8   | 19,9  | 8,9            | 29,2  | 24,3  |
| Juegos de cartas  | 1,5    | 0,7   | 0,6            | 1,2   | 1,1   |
| Apuestas deportivas (no incluye quiniela)                                     | 3,3    | 0,2   | 3,6            | 1,1   | 1,7   |
| Máquinas tragaperras  | 1,2    | 0,0   | 1,1            | 0,4   | 0,6   |
| Juegos de casino (ruleta, Black Jack...)                                      | 0,2    | 0,0   | 0,5            | 0,0   | 0,1   |
| Bingo   | 0,0    | 0,1   | 0,0            | 0,1   | 0,1   |
| Otros   | 0,1    | 0,0   | 0,0            | 0,1   | 0,1   |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 78. Evolución de la frecuencia de la práctica de distintos tipos de juego en los últimos 12 meses. 2017 (%)**

|   | 2012 | 2017 |
|---|------|------|
| <b>Han jugado en los últimos 12 meses</b>                                     |      |      |
| Lotería, quinielas, primitiva, bono-loto                                      | 53,3 | 68,7 |
| Juegos de cartas  | 3,2  | 2,9  |
| Apuestas deportivas (no incluye quiniela)                                     | 1,6  | 7,3  |
| Máquinas tragaperras  | 2,6  | 2,7  |
| Juegos de casino (ruleta, Black Jack...)                                      | 1,7  | 1,2  |
| Bingo   | 1,8  | 1,1  |
| Otros   | 1,5  | 0,2  |
| <b>Han jugado en los últimos 12 meses con una frecuencia al menos semanal</b> |      |      |
| Lotería, quinielas, primitiva, bono-loto                                      | 21,7 | 24,3 |
| Juegos de cartas  | 0,6  | 1,1  |
| Apuestas deportivas (no incluye quiniela)                                     | 0,2  | 1,7  |
| Máquinas tragaperras  | 0,5  | 0,6  |
| Juegos de casino (ruleta, Black Jack...)                                      | 0,1  | 0,1  |
| Bingo   | 0,1  | 0,1  |
| Otros   | 0,3  | 0,1  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

## 7.2. Utilización de diferentes vías de acceso al juego

**Tabla 79. Utilización de diferentes vías de acceso al juego entre la población total. 2017 (%)**

|  | Ha acudido físicamente a establecimientos especializados en juegos de azar o apuestas o utilizar terminales de apuestas en bares u otros establecimientos hosteleros | Ha accedido mediante un dispositivo personal (móvil, ordenador, tablet, etc.) a páginas web o aplicaciones de juegos de azar o apuestas |
|--|--|---|
| Sí, ha utilizado en el último año                          | 25,5   | 2,0   |
| No, pero ha jugado en el último año a través de otras vías | 46,1   | 69,6  |
| No ha jugado en el último año                              | 28,4   | 28,4  |
| Total  | 100,0  | 100,0   |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

### 7.3. Gasto en el último año y cantidad máxima gastada en prácticas de juego

**Tabla 80. Gasto en el último año y cantidad máxima gastada en prácticas de juego. 2017 (%)**

|   | Distribución de la población | Distribución de la población que ha jugado con dinero en los últimos 12 meses |
|---|------------------------------|---|
| <b>Gasto en el último año</b>                   |                              |   |
| No ha jugado con dinero en los últimos 12 meses | 28,4                         | --  |
| Menos de 100 euros                              | 41,5                         | 58,0  |
| Entre 100 y 299 euros                           | 20,2                         | 28,1  |
| Entre 300 y 499 euros                           | 5,2                          | 7,3   |
| Entre 500 y 999 euros                           | 3,4                          | 4,7   |
| 1.000 o más euros                               | 0,5                          | 0,7   |
| NS/NC   | 0,8                          | 1,1   |
| Total   | 100,0                        | 100,0   |
| <b>Cantidad máxima gastada en un solo día</b>   |                              |   |
| No ha jugado con dinero en los últimos 12 meses | 28,4                         | --  |
| Menos de 6 euros                                | 26,0                         | 36,3  |
| Entre 6 y 29 euros                              | 32,1                         | 44,9  |
| Entre 30 y 59 euros                             | 7,7                          | 10,8  |
| Entre 60 y 299 euros                            | 4,7                          | 6,6   |
| 300 o más euros                                 | 0,6                          | 0,8   |
| NS/NC   | 0,5                          | 0,7   |
| Total   | 100,0                        | 100,0   |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

**Tabla 81. Gasto en el último año y cantidad máxima gastada en prácticas de juego por sexo y grupos de edad. 2017 (% sobre la población total)**

|   | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|---|--------|-------|----------------|-------|-------|
|   | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| <b>Gasto en el último año</b>                 |        |       |                |       |       |
| No ha jugado en el último año                 | 26,8   | 29,9  | 49,0           | 21,8  | 28,4  |
| Ha gastado menos de 300 euros                 | 58,9   | 64,5  | 46,6           | 66,5  | 61,7  |
| Ha gastado entre 300 y 999 euros              | 12,6   | 4,6   | 3,5            | 10,2  | 8,6   |
| Ha gastado 1.000 o más euros                  | 0,8    | 0,3   | 0,3            | 0,6   | 0,5   |
| NS/NC   | 0,9    | 0,8   | 0,6            | 0,9   | 0,8   |
| Total   | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |
| <b>Cantidad máxima gastada en un solo día</b> | 26,8   | 29,9  | 49,0           | 21,8  | 28,4  |
| No ha jugado en el último año                 | 54,8   | 61,4  | 43,7           | 62,7  | 58,1  |
| Ha gastado menos de 30 euros                  | 16,7   | 8,3   | 6,8            | 14,2  | 12,4  |
| Ha gastado entre 30 y 299 euros               | 1,1    | 0,0   | 0,3            | 0,6   | 0,6   |
| Ha gastado 300 o más euros                    | 0,6    | 0,4   | 0,2            | 0,6   | 0,5   |
| NS/NC   | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |
| Total   | 26,8   | 29,9  | 49,0           | 21,8  | 28,4  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

#### 7.4. Prácticas de juego de riesgo y adicción

**Tabla 82. Frecuencia de la práctica de distintos tipos de juego en los últimos 12 meses. 2017 (%)**

|  | Sin juego activo | Con juego activo* |         |                       |                        |       | Total |
|--|------------------|-------------------|---------|-----------------------|------------------------|-------|-------|
|  |                  | Nunca             | A veces | La mayoría del tiempo | Casi siempre o siempre | NS/NC |       |
| Ha apostado más dinero del que se podía permitir perder                                    | 73,7             | 25,4              | 0,7     | 0,1                   | 0,0                    | 0,1   | 100,0 |
| Ha necesitado apostar cada vez más dinero para conseguir el mismo grado de excitación      | 73,7             | 25,8              | 0,3     | 0,1                   | 0,0                    | 0,1   | 100,0 |
| Ha vuelto a jugar para recuperar el dinero que había perdido jugando                       | 73,7             | 24,5              | 1,5     | 0,1                   | 0,0                    | 0,1   | 100,0 |
| Ha vendido alguna cosa o ha tenido que pedir dinero prestado para poder jugar              | 73,7             | 25,9              | 0,2     | 0,0                   | 0,0                    | 0,1   | 100,0 |
| Ha sentido alguna vez que quizá tiene un problema con el juego                             | 73,7             | 25,7              | 0,5     | 0,0                   | 0,0                    | 0,1   | 100,0 |
| Alguna vez el juego le ha causado problemas de salud, como estrés o angustia               | 73,7             | 25,8              | 0,3     | 0,0                   | 0,0                    | 0,1   | 100,0 |
| La gente le ha criticado por apostar dinero o le han dicho que tiene un problema de juego  | 73,7             | 25,5              | 0,6     | 0,0                   | 0,0                    | 0,1   | 100,0 |
| Sus hábitos de juego le han causado problemas económicos a usted o a alguien de su entorno | 73,7             | 25,7              | 0,4     | 0,0                   | 0,0                    | 0,1   | 100,0 |
| Se ha sentido culpable por sus hábitos de juego o por lo que le ocurre cuando juega        | 73,7             | 25,4              | 0,6     | 0,1                   | 0,1                    | 0,1   | 100,0 |

\*Se considera práctica de juego activa si en el último año se ha apostado o jugado a algún juego al menos una vez por semana o si se ha gastado en el último año 500 o más euros en juego.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 83. Distribución de la población en función del nivel de riesgo en relación al juego. 2017 (%)**

|                       | Número    | Distribución entre la población total | Distribución entre la población que es jugadora activa |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------|--|
| Sin juego activo      | 1.225.318 | 73,7                                  |  |
| Con juego activo      | 436.906   | 26,3                                  | 100,0  |
| -Sin riesgo           | 394.576   | 23,7                                  | 90,3   |
| -Bajo riesgo          | 31.758    | 1,9                                   | 7,3  |
| -Riesgo moderado      | 7.229     | 0,4                                   | 1,7  |
| -Jugador/a excesivo/a | 3.344     | 0,2                                   | 0,8  |
| Total                 | 1.662.224 | 100,0                                 |  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

**Tabla 84. Distribución de la población en función del nivel de riesgo en relación al juego por sexo y grupos de edad. 2017 (% sobre el conjunto de la población)**

|                       | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|-----------------------|--------|-------|----------------|-------|-------|
|                       | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Sin juego activo      | 67,5   | 79,9  | 87,1           | 69,5  | 73,7  |
| Con juego activo      | 32,5   | 20,1  | 12,9           | 30,5  | 26,3  |
| -Sin riesgo           | 28,6   | 18,9  | 10,1           | 28,1  | 23,7  |
| -Bajo riesgo          | 2,7    | 1,1   | 1,7            | 2,0   | 1,9   |
| -Riesgo moderado      | 0,9    | 0,0   | 0,7            | 0,4   | 0,4   |
| -Jugador/a excesivo/a | 0,3    | 0,1   | 0,5            | 0,1   | 0,2   |
| Total                 | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 85. Evolución de la distribución de la población en función del nivel de riesgo en relación al juego. 2017 (%)**

|                       | 2012  | 2017  |
|-----------------------|-------|-------|
| Sin juego activo      | 77,4  | 73,7  |
| Con juego activo      | 22,6  | 26,3  |
| -Sin riesgo           | 19,8  | 23,7  |
| -Bajo riesgo          | 2,4   | 1,9   |
| -Riesgo moderado      | 0,1   | 0,4   |
| -Jugador/a excesivo/a | 0,3   | 0,2   |
| Total                 | 100,0 | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

## 8. USO DE INTERNET

### 8.1. Frecuencia de uso de internet

**Tabla 86. Frecuencia de uso de internet en los últimos 30 días por sexo y grupos de edad. 2017 (% sobre el conjunto de la población)**

|  | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|--|--------|-------|----------------|-------|-------|
|  | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| <b>Día medio laborable (lunes a jueves)</b>        |        |       |                |       |       |
| Nunca ha utilizado internet                        | 13,9   | 15,9  | 3,2            | 18,6  | 14,9  |
| No lo ha utilizado en los últimos 30 días          | 2,3    | 1,9   | 0,7            | 2,6   | 2,1   |
| Media hora o menos                                 | 32,5   | 33,1  | 13,4           | 39,0  | 32,8  |
| Alrededor de 1 hora                                | 27,4   | 25,5  | 30,1           | 25,3  | 26,4  |
| Alrededor de 2 a 3 horas                           | 18,1   | 16,9  | 35,5           | 11,8  | 17,5  |
| Alrededor de 4 a 5 horas                           | 3,8    | 4,5   | 11,6           | 1,8   | 4,2   |
| 6 o más horas                                      | 2,1    | 2,1   | 5,6            | 1,0   | 2,1   |
| Total  | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |
| <b>Día medio fin de semana (viernes a domingo)</b> |        |       |                |       |       |
| Nunca ha utilizado internet                        | 13,9   | 15,9  | 3,2            | 18,6  | 14,9  |
| No lo ha utilizado en los últimos 30 días          | 4,7    | 4,2   | 2,2            | 5,2   | 4,4   |
| Media hora o menos                                 | 29,2   | 29,2  | 12,4           | 34,6  | 29,2  |
| Alrededor de 1 hora                                | 20,7   | 21,0  | 19,2           | 21,4  | 20,8  |
| Alrededor de 2 a 3 horas                           | 23,1   | 21,3  | 37,4           | 17,4  | 22,2  |
| Alrededor de 4 a 5 horas                           | 6,2    | 6,1   | 17,7           | 2,5   | 6,2   |
| 6 o más horas                                      | 2,2    | 2,2   | 8,0            | 0,4   | 2,2   |
| Total  | 100,0  | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

### 8.2. Uso de riesgo o problemático de internet

**Tabla 87. Distribución de distintos usos de riesgo de internet. 2017 (%)**

|  | No ha utilizado internet en los últimos 12 meses | Ha utilizado internet en los últimos 12 meses |      |       | Total |
|--|--|---|------|-------|-------|
|  |  | Sí  | No   | NS/NC |       |
| Dedica más tiempo del que cree que debería a estar conectado a Internet con objetivos distintos a los de su trabajo o estudios | 14,9   | 17,1  | 67,6 | 0,4   | 100,0 |
| Piensa que se sentiría mal si redujera el tiempo que pasa en Internet  | 14,9   | 3,7   | 81,1 | 0,3   | 100,0 |
| Se han quejado sus familiares de las horas que dedica a Internet   | 14,9   | 8,9   | 76,2 | 0,1   | 100,0 |
| Le resulta duro permanecer alejado de Internet varios días seguidos  | 14,9   | 9,2   | 75,7 | 0,3   | 100,0 |
| Se resienten sus relaciones por estar conectado a la Red   | 14,9   | 1,8   | 83,2 | 0,1   | 100,0 |
| Existen contenidos o servicios de la Red a los que encuentra difícil resistirse  | 14,9   | 8,2   | 76,7 | 0,2   | 100,0 |
| Tiene problemas para controlar el impulso de conectarse a la Red   | 14,9   | 2,9   | 82,1 | 0,2   | 100,0 |
| Ha intentado, sin éxito, reducir su uso  | 14,9   | 3,1   | 81,9 | 0,1   | 100,0 |
| Obtiene gran parte de su bienestar del hecho de estar conectado a la Red   | 14,9   | 6,0   | 78,6 | 0,5   | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

**Tabla 88. Prevalencia entre la población total de distintos usos de riesgo de internet por sexo y grupos de edad. 2017 (%)**

|  | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|--|--------|-------|----------------|-------|-------|
|  | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Dedica más tiempo del que cree que debería a estar conectado a Internet con objetivos distintos a los de su trabajo o estudios | 19,2   | 21,0  | 44,8           | 10,8  | 20,1  |
| Piensa que se sentiría mal si redujera el tiempo que pasa en Internet  | 4,1    | 4,7   | 9,4            | 2,5   | 4,4   |
| Se han quejado sus familiares de las horas que dedica a Internet   | 10,6   | 10,3  | 25,4           | 4,8   | 10,5  |
| Le resulta duro permanecer alejado de Internet varios días seguidos  | 9,9    | 11,6  | 21,3           | 6,8   | 10,8  |
| Se resienten sus relaciones por estar conectado a la Red   | 2,1    | 2,1   | 4,7            | 1,1   | 2,1   |
| Existen contenidos o servicios de la Red a los que encuentra difícil resistirse  | 8,6    | 10,6  | 21,2           | 5,2   | 9,6   |
| Tiene problemas para controlar el impulso de conectarse a la Red   | 2,7    | 4,0   | 8,5            | 1,4   | 3,4   |
| Ha intentado, sin éxito, reducir su uso  | 2,7    | 4,6   | 9,9            | 1,3   | 3,7   |
| Obtiene gran parte de su bienestar del hecho de estar conectado a la Red   | 7,0    | 7,2   | 15,0           | 4,1   | 7,1   |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 89. Distribución de la población en función del nivel de riesgo en el uso de internet de acuerdo al test de Orman. 2017 (%)**

|                           | Número  | Distribución entre la población total | Distribución entre la población que ha utilizado internet en los últimos 12 meses |
|---------------------------|---------|---------------------------------------|---|
| No es usuaria de internet | 247564  | 14,9                                  | -   |
| Sin problemas (0-3)       | 1330797 | 80,1                                  | 95,0  |
| Con riesgo (4-6)          | 72020   | 4,3                                   | 4,3   |
| Uso problemático (7-9)    | 11843   | 0,7                                   | 0,7   |
| Total                     | 1662224 | 100,0                                 | 100,0   |

Nota: El test de adicción a internet utilizado, diseñado por Orman en 1996, consiste en un instrumento compuesto por 9 ítems (los que se recogen en la tabla anterior) que permite diferenciar tres grupos de personas usuarias según la puntuación alcanzada.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

**Tabla 90. Evolución de la distribución de la población en función del nivel de riesgo en el uso de internet de acuerdo al test de Orman. (%)**

|                           | 2012  | 2017  |
|---------------------------|-------|-------|
| No es usuaria de internet | 27,1  | 14,9  |
| Sin problemas (0-3)       | 69,9  | 80,1  |
| Con riesgo (4-6)          | 1,8   | 4,3   |
| Uso problemático (7-9)    | 1,2   | 0,7   |
| Total                     | 100,0 | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.



## 9. PERCEPCIÓN SOCIAL RESPECTO AL CONSUMO DE DROGAS Y VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS

### 9.1. Valoración de la gravedad atribuida al consumo de sustancias y a la adicción al juego

**Tabla 91. Valoración de la gravedad atribuida al consumo de diversas sustancias. 2017 (%)**

|                       | Nada grave | Algo grave | Bastante grave | Muy grave | NS/NC | Total |
|-----------------------|------------|------------|----------------|-----------|-------|-------|
| Alcohol               | 5,9        | 29,5       | 45,7           | 17,7      | 1,2   | 100,0 |
| Tabaco                | 4,8        | 26,9       | 44,9           | 22,3      | 1,1   | 100,0 |
| Cannabis              | 4,9        | 19,5       | 36,6           | 25,5      | 13,4  | 100,0 |
| Otras drogas ilegales | 4,8        | 16,8       | 25,0           | 34,6      | 18,8  | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 92. Valoración de la gravedad atribuida a la adicción al juego. 2017 (%)**

|       | Nada grave | Algo grave | Bastante grave | Muy grave | NS/NC | Total |
|-------|------------|------------|----------------|-----------|-------|-------|
| Juego | 7,2        | 29,4       | 33,3           | 20,5      | 9,6   | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 93. Valoración de la gravedad atribuida al consumo de diversas sustancias y al problema de la adicción al juego por sexo y grupos de edad. 2017 (% de quienes responden bastante o muy grave)**

|                       | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|-----------------------|--------|-------|----------------|-------|-------|
|                       | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Alcohol               | 55,9   | 70,7  | 55,9           | 65,7  | 63,3  |
| Tabaco                | 62,5   | 71,8  | 67,8           | 67,0  | 67,2  |
| Cannabis              | 58,1   | 66,1  | 60,0           | 62,8  | 62,1  |
| Otras drogas ilegales | 59,0   | 60,4  | 53,1           | 61,7  | 59,7  |
| Juego                 | 52,2   | 55,4  | 49,3           | 55,2  | 53,8  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 94. Evolución de la valoración de la gravedad atribuida al consumo de diversas sustancias (% de quienes responden bastante o muy grave)**

|                       | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2017 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alcohol               | 93,0 | 93,4 | 88,9 | 76,9 | 70,8 | 61,8 | 58,3 | 58,8 | 64,8 | 56,5 | 53,2 | 63,3 |
| Tabaco                | --   | --   | --   | 69,2 | 59,5 | 51,8 | 68,7 | 63,0 | 66,5 | 63,4 | 57,8 | 67,2 |
| Cannabis              | --   | --   | --   | --   | --   | --   | 63,6 | 62,7 | 71,9 | 67,9 | 61,0 | 62,1 |
| Otras drogas ilegales | 95,0 | 96,0 | 90,3 | 84,5 | 80,9 | 72,4 | 77,0 | 72,9 | 80,0 | 74,5 | 68,5 | 59,7 |
| Juego                 | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | 52,6 | 53,8 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

## 9.2. Percepción sobre la evolución del consumo de diversas sustancias en los últimos años

**Tabla 95. Percepción sobre la evolución del consumo de diversas sustancias en los últimos años. 2017 (%)**

|          | Ha aumentado | Sigue igual | Ha disminuido | NS/NC | Total |
|----------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|
| Alcohol  | 48,7         | 38,2        | 8,5           | 4,7   | 100,0 |
| Tabaco   | 21,9         | 24,7        | 50,6          | 2,8   | 100,0 |
| Cannabis | 43,6         | 30,4        | 4,5           | 21,5  | 100,0 |
| Cocaína  | 34,8         | 23,4        | 6,6           | 35,2  | 100,0 |
| Heroína  | 13,9         | 14,7        | 31,7          | 39,6  | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 96. Percepción sobre la evolución del consumo de diversas sustancias en los últimos años por sexo y grupos de edad. 2017 (% de quienes responden que ha aumentado)**

|          | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|----------|--------|-------|----------------|-------|-------|
|          | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Alcohol  | 40,9   | 56,4  | 55,6           | 46,5  | 48,7  |
| Tabaco   | 20,4   | 23,5  | 34,0           | 18,1  | 21,9  |
| Cannabis | 40,9   | 46,2  | 46,3           | 42,7  | 43,6  |
| Cocaína  | 32,3   | 37,2  | 37,1           | 34,0  | 34,8  |
| Heroína  | 12,7   | 15,1  | 13,1           | 14,2  | 13,9  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 97. Evolución de la percepción sobre la evolución del consumo de diversas sustancias en los últimos años (% de quienes responden que ha aumentado)**

|          | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2017 |
|----------|------|------|------|------|------|------|
| Alcohol  | 62,2 | 58,1 | 55,2 | 47,4 | 43,9 | 48,7 |
| Tabaco   | 52,7 | 46,5 | 35,0 | 28,1 | 23,4 | 21,9 |
| Cannabis | 63,1 | 60,4 | 61,0 | 48,0 | 33,3 | 43,6 |
| Cocaína  | 60,0 | 55,4 | 60,0 | 37,6 | 27,5 | 34,8 |
| Heroína  | 18,1 | 12,5 | 21,2 | 25,9 | 21,7 | 13,9 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

### 9.3. Opinión sobre los problemas que acarrear diversas pautas de consumo de sustancias y diversas prácticas

**Tabla 98. Opinión sobre los problemas que acarrear diversas pautas de consumo de sustancias y diversas prácticas. 2017 (%)**

|   | Ninguno | Pocos | Bastantes | Muchos | NS/NC | Total |
|---|---------|-------|-----------|--------|-------|-------|
| Fumar 5 cigarrillos al día  | 7,8     | 41,5  | 37,3      | 13,0   | 0,5   | 100,0 |
| Fumar un paquete diario de tabaco   | 0,2     | 1,9   | 30,1      | 67,6   | 0,1   | 100,0 |
| Tomarse 5 o 6 cañas o copas el fin de semana  | 13,2    | 51,4  | 25,0      | 9,5    | 0,8   | 100,0 |
| Tomarse 5 o 6 cañas o copas cada día  | 0,5     | 4,9   | 35,2      | 58,9   | 0,4   | 100,0 |
| Tomarse 1 o 2 cañas o copas cada día  | 10,4    | 46,5  | 30,7      | 11,8   | 0,7   | 100,0 |
| Fumar cannabis una vez o menos al mes   | 14,9    | 40,7  | 21,2      | 14,5   | 8,7   | 100,0 |
| Fumar cannabis una vez por semana o más   | 6,0     | 20,9  | 32,3      | 32,5   | 8,3   | 100,0 |
| Tomar tranquilizantes, sedantes o somníferos una vez o menos al mes   | 15,7    | 41,8  | 21,1      | 12,2   | 9,2   | 100,0 |
| Tomar tranquilizantes, sedantes o somníferos de una a tres veces por semana   | 5,5     | 21,1  | 40,2      | 25,0   | 8,2   | 100,0 |
| Tomar tranquilizantes, sedantes o somníferos a diario o casi a diario   | 3,7     | 6,8   | 20,1      | 62,2   | 7,3   | 100,0 |
| Consumir éxtasis una vez o menos al mes   | 1,3     | 9,2   | 24,9      | 56,8   | 7,7   | 100,0 |
| Consumir cocaína una vez o menos al mes   | 1,5     | 8,6   | 25,5      | 58,5   | 5,8   | 100,0 |
| Consumir heroína una vez o menos al mes   | 0,7     | 4,3   | 22,2      | 67,1   | 5,7   | 100,0 |
| Consumir alucinógenos (ácidos, tripis, LSD) una vez o menos al mes  | 0,9     | 5,4   | 21,9      | 65,5   | 6,4   | 100,0 |
| Jugar a juegos de azar o apuestas con una frecuencia al menos semanal o gastar más de 700 euros al año en esta actividad                        | 5,2     | 18,7  | 35,9      | 38,6   | 1,7   | 100,0 |
| Emplear más de 3 horas diarias a actividades que requieran el uso de internet sin considerar el tiempo empleado en tareas escolares o laborales | 5,1     | 21,3  | 44,7      | 27,0   | 2,0   | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 99. Opinión sobre los problemas que acarrear diversas pautas de consumo de sustancias y diversas prácticas por sexo y edad. 2017 (% de quienes responden pocos o ningún problema)**

|   | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|---|--------|-------|----------------|-------|-------|
|   | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Fumar 5 cigarrillos al día  | 54,3   | 44,3  | 40,2           | 52,2  | 49,3  |
| Fumar un paquete diario de tabaco   | 2,6    | 1,8   | 2,5            | 2,1   | 2,2   |
| Tomarse 5 o 6 cañas o copas el fin de semana  | 70,7   | 58,6  | 68,4           | 63,4  | 64,6  |
| Tomarse 5 o 6 cañas o copas cada día  | 7,7    | 3,3   | 4,5            | 5,8   | 5,5   |
| Tomarse 1 o 2 cañas o copas cada día  | 65,9   | 48,0  | 54,8           | 57,5  | 56,9  |
| Fumar cannabis una vez o menos al mes   | 62,3   | 49,0  | 71,3           | 50,6  | 55,6  |
| Fumar cannabis una vez por semana o más   | 33,1   | 20,8  | 35,3           | 24,2  | 26,9  |
| Tomar tranquilizantes, sedantes o somníferos una vez o menos al mes   | 56,2   | 58,7  | 53,1           | 58,8  | 57,4  |
| Tomar tranquilizantes, sedantes o somníferos de una a tres veces por semana   | 25,8   | 27,5  | 18,5           | 29,3  | 26,7  |
| Tomar tranquilizantes, sedantes o somníferos a diario o casi a diario   | 9,0    | 11,8  | 4,7            | 12,3  | 10,4  |
| Consumir éxtasis una vez o menos al mes   | 13,5   | 7,5   | 14,9           | 9,1   | 10,5  |
| Consumir cocaína una vez o menos al mes   | 13,7   | 6,5   | 14,8           | 8,6   | 10,1  |
| Consumir heroína una vez o menos al mes   | 7,1    | 2,9   | 8,4            | 3,9   | 5,0   |
| Consumir alucinógenos (ácidos, tripis, LSD) una vez o menos al mes  | 8,7    | 3,7   | 10,4           | 4,9   | 6,2   |
| Jugar a juegos de azar o apuestas con una frecuencia al menos semanal o gastar más de 700 euros al año en esta actividad                        | 28,3   | 19,5  | 17,5           | 25,9  | 23,9  |
| Emplear más de 3 horas diarias a actividades que requieran el uso de internet sin considerar el tiempo empleado en tareas escolares o laborales | 32,4   | 20,5  | 39,0           | 22,4  | 26,4  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 100. Evolución de la opinión sobre los problemas que acarrear diversas pautas de consumo de sustancias (% de quienes responden pocos o ningún problema)**

|   | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2017 |
|---|------|------|------|------|------|
| Fumar un paquete diario de tabaco   | 11,2 | 12,6 | 7,7  | 10,7 | 2,2  |
| Tomarse 5 o 6 cañas o copas el fin de semana                                | 65,5 | 66,9 | 60,3 | 59,5 | 64,6 |
| Tomarse 5 o 6 cañas o copas cada día  | 12,6 | 15,7 | 10,1 | 8,4  | 5,5  |
| Fumar cannabis una vez o menos al mes                                       | 58,5 | 60,1 | 52,3 | 52,7 | 55,6 |
| Fumar cannabis una vez por semana o más                                     | 36,1 | 35,9 | 27,4 | 25,7 | 26,9 |
| Tomar tranquilizantes, sedantes o somníferos una vez o menos al mes         | 58,1 | 58,1 | 55,5 | 57,5 | 57,4 |
| Tomar tranquilizantes, sedantes o somníferos de una a tres veces por semana | 31,1 | 30,8 | 30,6 | 25,5 | 26,7 |
| Consumir éxtasis una vez o menos al mes                                     | 12,5 | 16,9 | 13,5 | 15,2 | 10,5 |
| Consumir cocaína una vez o menos al mes                                     | 3,1  | 3,3  | 4,4  | 2,5  | 10,5 |
| Consumir heroína una vez o menos al mes                                     | 10,3 | 13,8 | 10,1 | 13,2 | 5,0  |
| Consumir alucinógenos (ácidos, tripis, LSD) una vez o menos al mes          | 2,3  | 2,6  | 4,0  | 1,8  | 6,2  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

#### 9.4. Accesibilidad de diversas sustancias

**Tabla 101. Grado de dificultad percibido para obtener en un plazo de 24 horas diversas sustancias. 2017 (%)**

|                                      | Prácticamente imposible | Difícil | Relativamente fácil | Muy fácil | NS/NC | Total |
|--------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------|-----------|-------|-------|
| Cannabis                             | 29,9                    | 13,8    | 22,8                | 28,8      | 4,7   | 100,0 |
| Heroína                              | 54,5                    | 23,2    | 8,5                 | 4,8       | 9,0   | 100,0 |
| Cocaína                              | 45,1                    | 17,4    | 19,2                | 11,3      | 6,9   | 100,0 |
| Alucinógenos (LSD, ácido, tripis)    | 49,1                    | 22,5    | 13,5                | 6,8       | 8,1   | 100,0 |
| Anfetaminas o speed                  | 45,3                    | 17,4    | 19,0                | 10,5      | 7,8   | 100,0 |
| MDMA y similares, éxtasis, pastillas | 47,1                    | 20,3    | 15,9                | 8,2       | 8,5   | 100,0 |
| Psicofármacos sin receta médica      | 42,3                    | 24,2    | 14,3                | 10,1      | 9,2   | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 102. Grado de dificultad percibido para obtener en un plazo de 24 horas diversas sustancias por sexo y grupos de edad. 2017 (% de quienes responden relativamente fácil o muy fácil)**

|                                      | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|--------------------------------------|--------|-------|----------------|-------|-------|
|                                      | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Cannabis                             | 56,2   | 47,0  | 73,7           | 44,5  | 51,6  |
| Heroína                              | 12,5   | 14,2  | 14,4           | 13,0  | 13,4  |
| Cocaína                              | 31,5   | 29,6  | 42,7           | 26,7  | 30,5  |
| Alucinógenos (LSD, ácido, tripis)    | 21,0   | 19,6  | 24,6           | 18,9  | 20,3  |
| Anfetaminas o speed                  | 30,8   | 28,2  | 39,7           | 26,3  | 29,5  |
| MDMA y similares, éxtasis, pastillas | 25,2   | 23,0  | 33,3           | 21,2  | 24,1  |
| Psicofármacos sin receta médica      | 23,5   | 25,3  | 25,7           | 24,0  | 24,4  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 103. Evolución del grado de dificultad percibido para obtener en un plazo de 24 horas diversas sustancias (% de quienes responden relativamente fácil o muy fácil)**

|                                      | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2017 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Cannabis                             | 72,0 | 51,4 | 57,3 | 68,8 | 60,1 | 67,4 | 73,1 | 72,6 | 68,9 | 51,6 |
| Heroína                              | 56,9 | 29,6 | 28,1 | 38,7 | 29,5 | 34,6 | 39,2 | 37,2 | 34,5 | 13,4 |
| Cocaína                              | 58,9 | 33,0 | 34,6 | 47,0 | 44,3 | 43,8 | 52,9 | 49,0 | 45,8 | 30,5 |
| Alucinógenos (LSD, ácido, tripis)    | --   | --   | --   | --   | 40,2 | 39,2 | 46,1 | 42,3 | 39,7 | 20,3 |
| Anfetaminas o speed                  | --   | --   | --   | --   | 49,0 | 44,7 | 53,1 | 47,2 | 44,5 | 29,5 |
| MDMA y similares, éxtasis, pastillas | --   | 38,8 | 43,0 | 56,8 | 48,0 | 43,1 | 51,0 | 45,5 | 41,4 | 24,1 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

## 9.5. Cercanía a personas consumidoras y/o con problemas con las drogas

**Tabla 104. Cercanía a personas consumidoras y/o con problemas con las drogas. 2017 (%)**

|  | No conoce a nadie | Conoce a una persona | Conoce a más de una persona | Conoce a bastantes personas | NS/NC | Total |
|--|-------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| Alguien que consuma drogas ilegales        | 36,9              | 6,1                  | 30,9                        | 25,9                        | 0,2   | 100,0 |
| Alguien que tenga problemas con el alcohol | 46,4              | 12,5                 | 31,1                        | 9,9                         | 0,1   | 100,0 |
| Alguien que tenga problemas con la cocaína | 73,5              | 5,0                  | 15,3                        | 4,4                         | 1,7   | 100,0 |
| Alguien que tenga problemas con la heroína | 90,7              | 2,4                  | 3,8                         | 1,4                         | 1,7   | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 105. Cercanía a personas consumidoras y/o con problemas con las drogas por sexo y grupos de edad. 2017 (% de quienes responden a más de una o a bastantes personas)**

|  | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|--|--------|-------|----------------|-------|-------|
|  | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Alguien que consuma drogas ilegales        | 61,4   | 52,4  | 56,8           | 79,2  | 49,8  |
| Alguien que tenga problemas con el alcohol | 42,5   | 39,3  | 40,9           | 36,4  | 42,3  |
| Alguien que tenga problemas con la cocaína | 21,1   | 18,5  | 19,8           | 24,1  | 18,4  |
| Alguien que tenga problemas con la heroína | 5,4    | 5,0   | 5,2            | 2,9   | 5,9   |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 106. Evolución de la cercanía a personas consumidoras y/o con problemas con las drogas (% de quienes responden a más de una o a bastantes personas)**

|  | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2017 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Alguien que consuma drogas ilegales        | 54,9 | 49,4 | 45,7 | 44,6 | 38,9 | 49,8 |
| Alguien que tenga problemas con el alcohol | --   | --   | 44,6 | 42,7 | 36,3 | 42,3 |
| Alguien que tenga problemas con la cocaína | --   | --   | 21,1 | 20,0 | 14,9 | 18,4 |
| Alguien que tenga problemas con la heroína | --   | --   | 10,5 | 9,5  | 6,1  | 5,9  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

## 9.6. Conocimiento y valoración de la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias de 2016

**Tabla 107. Conocimiento y valoración de la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias. 2017 (%)**

|   | Número    | % sobre la población total | % sobre la población que conoce la Ley |
|---|-----------|----------------------------|--|
| No conoce o no ha oído hablar de la Ley | 1.352.674 | 81,4                       |  |
| Conoce o ha oído hablar de la Ley       | 309.550   | 18,6                       | 100,0                                  |
| -Muy buena                              | 28.325    | 1,7                        | 9,2                                    |
| -Buena                                  | 106.953   | 6,4                        | 34,6                                   |
| -Regular                                | 33.162    | 2,0                        | 10,7                                   |
| -Mala                                   | 12.639    | 0,8                        | 4,1                                    |
| -Muy mala                               | 531       | 0,0                        | 0,2                                    |
| -No sabe                                | 127.940   | 7,7                        | 41,3                                   |
| Total                                   | 1.662.224 | 100,0                      | 537,0                                  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 108. Conocimiento y valoración de la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias por sexo y grupos de edad. 2017 (%)**

|   | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|---|--------|-------|----------------|-------|-------|
|   | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| No conoce o no ha oído hablar de la Ley         | 82,6   | 80,2  | 88,9           | 79,0  | 81,4  |
| Conoce o ha oído hablar de la Ley               | 17,4   | 19,8  | 11,1           | 21,0  | 18,6  |
| Valoración de la Ley (entre quienes la conocen) | 46,2   | 41,6  | 54,1           | 41,9  | 43,7  |
| -Muy buena o buena                              | 7,9    | 13,2  | 8,2            | 11,1  | 10,7  |
| -Regular  | 6,6    | 2,2   | 7,2            | 3,8   | 4,3   |
| -Mala o muy mala                                | 39,3   | 43,1  | 30,4           | 43,2  | 41,3  |
| -No sabe  | 82,6   | 80,2  | 88,9           | 79,0  | 81,4  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

## 9.7. Valoración de ciertas medidas y actuaciones en materia de drogodependencias

**Tabla 109. Grado de acuerdo con diversas medidas en materia de drogodependencias. 2017 (%)**

|  | Muy de acuerdo | Bastante de acuerdo | Bastante en desacuerdo | Muy en desacuerdo | NS/NC | Total |
|--|----------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------|-------|
| Legalizar la venta de cannabis, prohibiendo la venta a menores de edad   | 19,0           | 33,6                | 19,8                   | 23,5              | 4,1   | 100,0 |
| Legalizar la venta de todas las drogas, tal y como están ahora el alcohol o el tabaco  | 4,1            | 10,0                | 24,6                   | 58,6              | 2,7   | 100,0 |
| Prohibir totalmente la publicidad de alcohol y tabaco  | 43,9           | 30,1                | 16,8                   | 6,8               | 2,5   | 100,0 |
| Permitir el uso terapéutico del cannabis en el tratamiento del cáncer u otras enfermedades   | 63,3           | 26,1                | 3,3                    | 3,2               | 4,1   | 100,0 |
| Administrar médicamente heroína a los consumidores/as que hayan fracasado en otros tratamientos  | 15,8           | 25,4                | 19,1                   | 21,7              | 18,0  | 100,0 |
| Abrir locales donde las personas con drogodependencias puedan consumir en condiciones mínimas de higiene   | 21,0           | 34,8                | 17,8                   | 20,9              | 5,5   | 100,0 |
| Permitir el cultivo de cannabis para el autoconsumo  | 19,2           | 32,3                | 21,4                   | 22,8              | 4,3   | 100,0 |
| Informar sobre cómo consumir drogas sin que perjudique   | 40,1           | 31,2                | 12,7                   | 11,7              | 4,3   | 100,0 |
| Regular los clubes de cannabis para que aquellas personas mayores de edad que deseen consumir cannabis puedan hacerlo de forma legal             | 27,1           | 33,0                | 16,9                   | 17,9              | 5,1   | 100,0 |
| Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo en terrazas, veladores o actividades y eventos que cuenten con autorización. | 33,5           | 30,6                | 17,4                   | 15,8              | 2,6   | 100,0 |
| Prohibir fumar dentro del coche cuando viajen menores  | 76,2           | 15,8                | 3,9                    | 3,3               | 0,9   | 100,0 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.



**Tabla 110. Grado de acuerdo con diversas medidas en materia de drogodependencias por sexo y grupos de edad. 2017 (% de quienes responden muy o bastante de acuerdo)**

|  | Sexo   |       | Grupos de edad |       | Total |
|--|--------|-------|----------------|-------|-------|
|  | Hombre | Mujer | 15-34          | 35-74 |       |
| Legalizar la venta de cannabis, prohibiendo la venta a menores de edad   | 56,1   | 49,0  | 52,6           | 55,2  | 51,7  |
| Legalizar la venta de todas las drogas, tal y como están ahora el alcohol o el tabaco  | 14,7   | 13,5  | 14,1           | 10,8  | 15,2  |
| Prohibir totalmente la publicidad de alcohol y tabaco  | 73,6   | 74,3  | 73,9           | 67,7  | 75,9  |
| Permitir el uso terapéutico del cannabis en el tratamiento del cáncer u otras enfermedades   | 88,6   | 90,2  | 89,4           | 89,7  | 89,3  |
| Administrar médicamente heroína a los consumidores/as que hayan fracasado en otros tratamientos  | 40,8   | 41,5  | 41,2           | 35,0  | 43,1  |
| Abrir locales donde las personas con drogodependencias puedan consumir en condiciones mínimas de higiene   | 55,5   | 56,1  | 55,8           | 49,3  | 57,9  |
| Permitir el cultivo de cannabis para el autoconsumo  | 56,2   | 46,9  | 51,5           | 60,8  | 48,6  |
| Informar sobre cómo consumir drogas sin que perjudique   | 70,6   | 72,1  | 71,3           | 76,8  | 69,6  |
| Regular los clubes de cannabis para que aquellas personas mayores de edad que deseen consumir cannabis puedan hacerlo de forma legal             | 66,4   | 53,8  | 60,1           | 65,0  | 58,5  |
| Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo en terrazas, veladores o actividades y eventos que cuenten con autorización. | 59,4   | 68,9  | 64,2           | 49,6  | 68,8  |
| Prohibir fumar dentro del coche cuando viajen menores  | 91,4   | 92,5  | 92,0           | 90,5  | 92,4  |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

**Tabla 111. Evolución del grado de acuerdo con diversas medidas en materia de drogodependencias (% de quienes responden muy o bastante de acuerdo)**

|  | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2017 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Legalizar la venta de cannabis, prohibiendo la venta a menores de edad                                   | 35,9 | --   | 58,0 | 52,4 | 51,1 | 48,9 | 47,2 | 51,7 |
| Legalizar la venta de todas las drogas, tal y como están ahora el alcohol o el tabaco                    | 24,8 | --   | 29,9 | 21,1 | 24,9 | 20,0 | 21,0 | 15,2 |
| Prohibir totalmente la publicidad de alcohol y tabaco  | --   | 56,9 | 65,9 | 56,4 | 61,0 | 62,1 | 59,9 | 75,9 |
| Permitir el uso terapéutico del cannabis en el tratamiento del cáncer u otras enfermedades               | --   | 77,3 | 89,9 | 91,1 | 89,2 | 89,2 | 82,2 | 89,3 |
| Administrar médicamente heroína a los consumidores/as que hayan fracasado en otros tratamientos          | --   | --   | --   | 60,0 | 65,4 | 57,4 | 50,3 | 43,1 |
| Abrir locales donde las personas con drogodependencias puedan consumir en condiciones mínimas de higiene | --   | 63,5 | 80,3 | 64,4 | 72,4 | 63,4 | 54,1 | 57,9 |
| Permitir el cultivo de cannabis para el autoconsumo  | --   | 38,1 | 54,4 | 46,5 | 54,9 | 54,7 | 52,1 | 48,6 |
| Informar sobre cómo consumir drogas sin que perjudique   | --   | 83,6 | 88,0 | 68,7 | 72,2 | 65,7 | 68,3 | 69,6 |

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.