



Programa del Adolescente de la Secretaria
de Salud São Paulo, Brasil

**REDUCCIÓN DEL EMBARAZO
ADOLESCENTES DE 10 A 14 ANOS
PROVINCIA DE SAN PABLO - BRASIL**

Albertina Duarte Takiuti, Wilson P. Souza, Joana S. Kerr,
Lelia Souza Fernandes, Arlindo Frederico Junior,
Rodolfo Pessoa de Melo Hermida, Maria de Fatima Duarte,
Lia Pinheiro, Caio S. Portella



Un poco de história...



1971 – Consulta externa Infanto-puberal – Prof. Dr Alvaro da Cunha Bastos- Hospital de Clínicas - USP

1986 – Se crea el Programa de salud Integral del adolescente

1988 – Se crea el SUS (integral, multiprofesional e intersectorial)

1990 - Estatuto del niño y del adolescente (ECA)

2005– Ley que efectiva el Programa del adolescente (n°11.976)



- ✓ Equipo Multiprofesional
- ✓ Servicio público gratuito

Hoy

- 30 Casas del Adolescente
- Asociaciones con Universidades (USP- Santa Casa, Unicamp, ABC, UNIP, FMU, PUC, Anhembi Morumbi e Inst. Sedes Sapientiae)
- Asociaciones con ONGs, Sindicatos
- Capacitación y Treinamiento de Profesionales
- Libros y Articulos
- Participación en Congresos
- Incontables Premios



PROGRAMA SAÚDE ADOLESCENTE SÃO PAULO



- **Implantación de 120 servicios en la Provincia, con formación de 29 Casas del Adolescente.**
- **Priorizadas dinámicas de grupos, oficinas lúdicas de promoción de salud como prevención de embarazo inoportuno, proyecto de vida, protagonismo juvenil.**
- **Binômio Rede Básica – Universidades, su actuación tiene sido en la generación de conocimientos y de recursos humanos.**
- **Como un importante resultado exitoso del Programa del Adolescente está la reducción del embarazo en la Adolescencia.**





INTRODUCCIÓN

- **Brasil y Colombia (A. Latina) poseen las más altas proporciones de nacimientos por madres menores de 15 años, y el riesgo de mortalidad materna es tres veces más elevado que de 15 a 19 años.**
- **Embarazo es la mayor causa de mortalidad de adolescentes en el mundo. El riesgo es 1/3,8 mil en países desarrollados, y 1/150 en países en desarrollo.**
- **El riesgo de muerte para el recién nacido aumenta en un 60% si la madre tiene menos de 18 años.**
- **Adolescentes vienen desarrollando comportamientos e intereses de riesgo más precozmente, a pubertad precoz, apelo sexual de los medios, abandono y baja escolaridad también se asocian al embarazo.**

OBJETIVO

El trabajo visa analizar la incidencia del número de nacimientos de hijos de madres adolescentes de 10 a 14 años en la Provincia de São Paulo-Brasil en el período de 1998 a 2010 y el impacto de las acciones del Programa Salud del Adolescente.





MATERIAL Y METODOS

Análisis de serie histórica de los índices del SEADE (Sistema Estatal de Análisis de Datos) y DATASUS (Banco de Datos del Sistema Único de Salud), en el período de 1998 a 2010 de adolescentes de 10 a 14 años en la Provincia de São Paulo, asociada a un fortalecimiento de las acciones del Programa Salud del Adolescente. El análisis estadístico donde los datos se compararon mediante la prueba exacta de Fisher, con la ayuda de software R versión 3.2.1. Se consideró el valor de $p < 0,05$ como significativo.





RESULTADOS

ANO	POPULAÇÃO FEMININA 10 a 14 ANÕS	NÚMERO NASCIDOS VIVOS	POR DIA	HORA
1998	1.754.983	4.528	12 / 24 hs	1 a cada 2,0 hs
2010	1.637.087	3.358	09 / 24 hs	1 a cada 2,7 hs

**REDUCCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS PROVINCIA DE SÃO PAULO - BRASIL.
PROGRAMA SAÚDE DO ADOLESCENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO**

Madres Adolescentes menores de 14 años en São Paulo - 1998 -2010



**REDUCCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS PROVINCIA DE SÃO PAULO - BRASIL.
PROGRAMA SAÚDE DO ADOLESCENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO**

Ocurrió una reducción del embarazo en la adolescencia del 20,5%, en adolescentes de 10 a 14 años en la Provincia de San Pablo. Se observó una disminución estadísticamente significativa en la tasa de nacimiento de 1998 para 2010 (20,5%), ($p = 2,2 \times 10^{-16}$). No se observó diferencia significativa en comparación con la variación en la tasa de natalidad de la población en general ($p = 1$).

En neste mismo período hubo un refuerzo en la implantación e implementación de las acciones del Programa del Adolescente. El hecho de haber desarrollado acciones de políticas públicas en la salud y otros sectores como educación, cultura, deporte, y social, han convergido en un impacto positivo en la disminución del embarazo en la adolescencia.



CONCLUSIÓN

Evaluando la serie histórica del período de 1998 a 2010 se nota que hubo reducción del embarazo en adolescentes entre 10 a 14 años de edad en el 20,5% en la Provincia de San Pablo, y los datos son coincidentes con la implantación y plena acción de una política pública de atención integral al adolescente.





CASA DO ADOLESCENTE

GRACIAS!!!

Lia Pinheiro

saudeadolescente@saúde.sp.gov.br