

SALUD ORAL EN LA ADOLESCENCIA



**La odontología tiene como misión,
prevenir, mantener y devolver la salud
oral a las personas para mejorar su
calidad de vida.**



ÍNDICE CPOD/ CEOD 5-6, 12, 15 AÑOS EN PARAGUAY

Año	1983	1987	1996	1999	2008	2017
CPOD ₁₂	5.9	4.02	5.08	3.54	2.79	2.7
CPOD ₁₅				5.59	4.34	3.14
Ceod 5					3.99	3.88
Ceod 6					5.57	

SEVERIDAD DE CARIES

SEVERIDAD	CPOD
31%	1-3
26%	4-6
16%	7 o más (severidad grave)

EN ODONTOLOGÍA...

Los adolescentes son uno de los grupos de mayor riesgo de afecciones bucales

Atraviesan por cambios hormonales

Concluye el cambio de denticiones, el crecimiento maxilar y las estructuras dentarias

Maloclusiones

Malos hábitos alimentarios y en ocasiones a trastornos alimentarios

Consumo de productos nocivos como alcohol y tabaco; ciertas modas como uso de piercings y una incorrecta higiene bucal

Embarazos a temprana edad.

LA ATENCIÓN SE CONVIERTE EN TODO UN RETO.





El adolescente es parte de una sociedad que promueve la cultura de la "belleza" con mayor intensidad, procedimientos estéticos, tratamientos ortodónticos y otros procedimientos cosméticos, en los que no se perciben la responsabilidad o las implicaciones éticas.

RIESGOS EN LA SALUD BUCAL EN LOS ADOLESCENTES

ASPECTOS IMPORTANTES RELACIONADOS CON LA SALUD BUCAL DEL ADOLESCENTE

Mayor riesgo de enfermedad periodontal

Son mas independientes, disponen de su tiempo

Se dejan de lado los buenos hábitos de higiene y de alimentación

Inician primeros contactos corporales, siendo de interés en el plano de la odontología
(Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia)

Incrementan actividades y deportes al aire libre

PERIODONTITIS JUVENIL

- ✓ Se caracteriza por la rápida pérdida del hueso alrededor de los dientes permanentes
- ✓ La prevalencia aumenta principalmente por falta de motivación en la práctica de la higiene oral.
- ✓ Cambios hormonales: aumento en nivel de las hormonas, como la progesterona y el estrógeno causan una mayor circulación sanguínea en las encías.





BRUXISMO

- ✓ **Acción incesante de rechinar y apretar los dientes de manera inadecuada, que puede ser de dos tipos: céntrico conocido como cierre forzado de los dientes y excéntrico el cual contempla el rechinamiento de los dientes.**
- ✓ **Factores etiológicos: estrés, ansiedad emocional y/o trastornos del sueño**



BRUXISMO


- ✓ Hipertonicidad no fisiológica de la musculatura masticatoria
- ✓ Dolor e inflamación
- ✓ Cefalea
- ✓ Dolores de oído
- ✓ Trastornos de la ATM
- ✓ Daños dentales (atrición, fracturas de dientes y restauraciones)
- ✓ Movilidad dentaria



FRACTURAS DENTARIAS

- ✓ Las fracturas dentarias por traumatismos de la cavidad bucal son frecuentes, la causa más frecuente en adolescentes son las peleas callejeras, deportes y juegos violentos o accidentes en moto





USO DE PIERCING

- ✓ Lesiones inflamatorias, dolor, infecciones locales, angina de Ludwig.
- ✓ Traumatismos y fracturas dentarias
- ✓ Alteraciones periodontales, acúmulo de placa bacteriana y cálculo
- ✓ Alteraciones del habla y la masticación



USO DE PIERCING

- ✓ Abscesos
- ✓ Aumento del flujo salival, cicatrices, interferencia con pruebas de rayos X, hemorragias
- ✓ Pérdidas de piezas dentales.
- ✓ Adolescentes con problemas cardíacos que no toman ninguna prevención



VAPEADORES

- ✓ Primera causa de cáncer oral
- ✓ Recesión de encías, presentando un mayor riesgo de padecer enfermedad periodontal
- ✓ Sequedad bucal, la sustancia se adhiere a la mucosa oral, lengua y dientes
- ✓ Halitosis característica
- ✓ Bruxismo, la nicotina es considerada un estimulante que dispara los músculos



ANOREXIA Y BULIMIA

- ✓ Poco o nulo interés en su cuidado de salud general y bucal
- ✓ Xerostomía
- ✓ Enf. periodontal
- ✓ Erosión dental



ANOREXIA Y BULIMIA

- ✓ Hipersensibilidad dentinaria
- ✓ Eritemas, petequias o hemorragias submucosas en el paladar especialmente en la úvula y paladar blando
- ✓ Aumento de volumen glándulas salivales
- ✓ Queilitis





Embarazo y
maternidad
de niñas
en Paraguay

EMBARAZO EN ADOLESCENTES

CASUÍSTICA

20.000 nacimientos de hijos de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años cada año

700 corresponden a niñas de entre 10 y 14 años

Dos partos diarios en esa franja etaria

QUE HACER



***La adolescencia es la etapa mas
confusa...somos tratados como niños,
pero esperan que actuemos como
adultos...***

Muchas gracias!!!!